יום שלישי 19 נובמבר 2024

הלסינקי	חוקר ראשי	איבר/ תחום /Organ	קו טיפולי	Study Title	קוד מחקר	Trial Purpose	הפנייה לניסוי clinical trial:	Sub-category	קטגוריה
0501-23	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	קו שני PART 1 NSCLC קו שלישי PART B4 TNBC	מחקר שלב 1x/a להערכת הבטיחות, הסבילות והפרמקוקינטיקה של GS-9716 כטיפול יחידני ובשילוב עם טיפולים נגד סרטן במטופלים עם ממאירויות מוצקות	GS-US-467-5643	**GS-9716 מדיר את המנה המרבית הנסבלת או את המינון המרבי המוערך ו/או את מינון שלב 2 המומלץ של כטיפול יחידני במאאירויות מוצקות מתקדמות מדי לאפיין את הבטיחות והסבילות של טיפול 9716 -GS-9716 יחידני ב**	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05008764?term=GS-US-467-5643&rank=1#locations		PHASE 1
0696-21	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors		מחקר שלב 1, בתווית גלויה, במבוגרים עולים, כולל שלב הרחבה על המינון הבחר, להערכת הבטיחות והיעילות של הזרקת תקן חד-חמצני לגידולים מוצקים בלתי נתיחים, שרים או תת-שרירים, שמקורם בסרטן המקור אי בורדה.	BA-ONC-01	**מטרה ראשונית: של (RP2D) ומינון מומלץ לפאזה 2 (MTD) לקבוע את פרופיל הבטיחות, את המינון המקסימלי הנסבל -הזרקת גז תקן חד-חמצני, באופן חד פעמי, שירות לתוך הגידול, בחולים עם גידול מוצק שרי, או תת שרי, שאינו מיועד או ניתן להסרה בניתוח. מטרה משנית: לבצע הערכה ראשונית של הפעילות האנטי-סרטנית של תכשיר המחקר במבוגרים השונים, כאשר ניתן במתן חד פעמי. מטרה אקספלורטורית: להעריך סמנים ביולוגיים העשויים לחזות פעילות אנטי-סרטנית של תכשיר המחקר, כאשר ניתן במתן חד פעמי.**	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05525468?term=2021104&draw=1&rank=1		PHASE 1
0192-22	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors		מחקר סל שלב 1b/2 רב מרכזי, גלוי תווית להערכת הבטיחות והיעילות של טיפול חד תרופתי בבמריזומאב (bemarituzumab) בגידולים מוצקים עם ביטוי יתר של FGFR2b (FORTITUDE-301)	20210104	**שלב 1 (הרצה לבטיחות): לצפות בבטיחות ובסבילות של במאריזומאב. שלב 2: להעריך את הפעילות הראשונית נגד הגידול.**	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05498687?term=1479-0001&draw=2&rank=1		PHASE 1
0791-22	ד"ר גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	קו ראשון /קו שני תלוי באיזה קוהורט	מחקר לבדיקת מינונים שונים של BI 1810631 בקרב מטופלים עם סוגים שונים של סרטן מתקדם (גידולים מוצקים עם שינוים בגן HER2)	1479-0001	**להעריך את שיעור התגובה האובייקטיבית של הגידול באמצעות ועדה מרכזית בלתי תלויה/חוקר בקרב BI 1810631 של המינונים שנחקרו עבור PK-והנשיק בחקירת הבטיחות, הסבילות וה - HER2-מתקדמים/גרורתי חיבי לומוציה ב NSCLC מטופלים עם**	https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04486847?term=1479-0001&draw=2&rank=1		Phase I
0707-20	פרופ גבע	Phase II	משתנה יש להתעדכן מול ראש צוות	ניסוי פאזה II בפלטפורמה לבחינת טיפול מותאם אימונו-אונקולוגי וטיפול סמוי ממוקד מטרה שאינו תלוי במקור הגידול (TAPISTRY).	BO41932	**להעריך את היעילות של טיפול המחקר במטופלים עם גידולים מוצקים חיבים לשינויים/סמנים ביולוגיים, מתקדמים או גרורתיים**	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04689845?cond=NCT04689845&draw=2&rank=1		Phase I
0974-20	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	משתנה יש להתעדכן מול ראש צוות	מחקר שלב 1a/1b עם העלאת מינון והרחבת מינון, להערכת הבטיחות, הפרמקוקינטיקה והיעילות של GDC-6036 כטיפול יחיד ובשילוב עם טיפולים אחרים נגד סרטן במטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים או גרורתיים בעלי מוטציית KRAS G12C	GO42144	**לבדוק את GDC-6036 ברמות מינון שונות כדי לגלות אם היא בטוחה ויעילה לבדה או בשילוב עם תרופות אחרות נגד סרטן, ולהבין את האופן שבו הגוף מעבד את התרופה.**	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04448674?cond=NCT04449874&draw=2&rank=1		Phase I
0329-21	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	משתנה יש להתעדכן מול ראש צוות	מחקר העלאת מינון, שלב 1, רב-מרכזי, בתווית פתוחה, המתבצע בכפוב הראשונה בבני אדם, לקביעת הבטיחות, הסבילות, הפרמקוקינטיקה והמינון המומלץ לשלב 2 של ABBV-151 כחומר יחיד ובשילוב עם ABBV-181 בנבדקים עם גידולים מוצקים גרורתיים או מתקדמים מקומית.	M19-345	**לקבוע את המנה המומלצת לפאזה 2 של ABBV-151 היעילה כמונותרפיה ובשילוב עם בד"ג'מאב**			Phase I
0913-20	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors		מחקר שלב 1/2 עם העלאת מינון והרחבה, להערכת הבטיחות, הסבילות והפעילות בנדת-הגידול של BND(-SAR- SANOFI 22 הניתן בנפרד ובשילוב עם פמברוליזומב או עם סטוקסמאב במטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים.	**BND-22-001**	**BND-22 להערך את הבטיחות והסבילות של .1 BND-22 (RP2D) ואת המינון המומלץ לשלב 2 (MAD) או המינון המרבי המוערך (MTD) לקבוע את המינון המרבי המסבל .2 מתכשיר יחיד 22**	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04717375?term=BND-22-001&draw=2&rank=1		Phase I
0107-22	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	מיצוי קווים	מחקר של XL092 בשילוב עם תרופות אימונו-אונקולוגיות בנבדקים עם גידולים מוצקים (STELLAR-002).	**XL092-002**	שלב העלאת המינון של הניסוי מתקיים כעת בארה"ב. בקשה זו נוספת לשלב הרחבת העוקבה. בלבד. המטרות של שלב הבה נמשאסרי טיפול משולב בעוקבות ספציפיות לגידול, לקבוע את XL092 הרחיבה הן להערך את היעילות הראשונית של הבטיחות של משטרי הטיפול המשולב, לקבוע את תרופות רכיבי הטיפול. ולהסיף להערך את הפרמקוקינטיקה בפלזמה של. במהן פומי יום, הניתנת כטיפול יחיד או בטיפול משולב בנבדקים עם סוגי סרטן מתקדמים באיבר המין בדרכי השתן XL092	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05117683?term=XL092-002&rank=1		Phase I
0825-15	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	משתנה יש להתעדכן מול ראש צוות	ניסוי קליני על פמברוליזומב (MK-3475), להערכת סמנים ביולוגיים המבוצעים תובנה לטיפול בקרב נבדקים עם גידולים מוצקים במצב מתקדם (KEYNOTE 158) **פאזה I**	MK-3475-158 /KEYNOTE-158	**להערך את ה-ORR לפמברוליזומב, בהתבסס על RECIST 1.1 כפי שמוערך על ידי סקירה רדיולוגית מרכזית בלתי-מלהיב, בנבדקים שלא נקבע להם מפן ביולוגי עם כל אחד מהסוגים הבאים של גידולים מוצקים מתקדמים (גרורתיים או שאינם ניתנים להסרה בניתוח) (קבוצות A-J**	https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02628067?term=2015-002067-41&rank=1	, Status Microsatellite Instability – High (MSI-H): Anal, Salivary, Small intestine, Gastric, Endometrial, Ovarian, Cervical, Breast, Prostate.	Phase I
0427-19	פרופ זוננבליק	PHASE Ib/II	משתנה יש להתעדכן מול ראש צוות	מחקר מטריה שלב 1a/2, בהקצאה אקראית, רב-מרכזי, בתווית פתוחה, להערכת היעילות והבטיחות של מספר שילובים של טיפולים מבוסס אימונותרפיה במטופלים עם סרטן של גרורתי שליבי לשלשת הסמנים (MORPHEUS TNBC)	CO40115	**מחקר זה יערוך את היעילות, הבטיחות והפרמקוקינטיקה של שילובי טיפולים מבוססי-אימונותרפיה במטופלים עם סרטן שד גרורתי שליבי לשלשת הסמנים (TNBC).**	https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03424005?cond=NCT03424005&draw=2&rank=1		Phase I
0787-22	פרופ גבע	Phase I /II	לפחות קו טיפול 1.	מחקר שלב 1/2 של BMS-986340 כטיפול יחיד ובשילוב עם ניבולמאב או עם דוסטאקוסל במשתתפים עם גידולים מוצקים בשלב מתקדם	CA052-002	**להעריך את הבטיחות והסבילות, ולקבוע את ה-MTD, ה-RP2D(s) ו/או ה-MAD של BMS-986340 הניתנת כטיפול יחיד ובשילוב עם ניבולמאב או עם דוסטאקוסל**	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04895276?term=CA052-002&draw=2&rank=1		Phase I/II
0547-22	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid Tumors and Lymphomas	קו ראשון SCCHN קו שלישי CRC	מחקר שלב 1, בתווית פתוחה, עם העלאה במינון, להערכת הבטיחות, הסבילות, הפרמקוקינטיקה והפרמקודינמיקה של TAK-676 כתרופה יחידה ובשילוב עם פמברוליזומב במבוגרים עם גידולים מוצקים מתקדמים או גרורתיים.	TAK-676-1002	**העלאת המינון: • לקבוע את הבטיחות והסבילות של העלאת מינון TAK-676 הניתנים בתור תרופה יחידה או בשילוב עם פמברוליזומב במטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים או גרורתיים. שלב ההרחבה: • לקבוע את הבטיחות והסבילות של TAK-676 בשילוב עם פמברוליזומב, עם או ללא כימותרפיה, במטופלים עם קרצינומת תאי קשקש של הראש והצוואר (SCCHN) נשנית, גרורתית או בלתי נתיחה, שלא טופלה בעבר. • לקבוע את הבטיחות והסבילות של TAK-676 בשילוב עם פמברוליזומב במטופלים עם סרטן המעי הגס והחלחלת (CRC) נשנה, מתקדם מקומית או גרורתי מסוג MSS/pMMR- MSI-H/dMMR, שטופל בעבר. כעת השלם חלק 1, ישראל משתתף בחלק 2 בחלק 3 בלבד.**	https://clinicaltrials.gov/search?term=TAK-676-1002		Phase I
0488-23	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid Tumors and Lymphomas	מיצוי קווים	ניסוי בדרוג יחידה, התערבותי, גלוי, רב מרכזי, ראשון בבני אדם, להערכת הבטיחות, הסבילות והיעילות הראשונים של ג'ל בבסוס פולימר המכיל ציפוליאטין (סומוקיין) בהזרקה תוך גידולית חד פעמית למטופלים בעלי גידול ראש – צוואר מסוג תאי קשקש (Squamous Cell Carcinoma) מתקדם, עמיד להקרנות, אשר מיצו את אפשרויות הטיפול הזמינות	CLPR-001	**מטרת הניסוי הראשונה היא לבחון את בטיחות הטיפול בשמוקיר בהזרקה חד פעמית לתוך גידול ראש – צוואר ראשוני מתקדם אי עמיד להקרנות. מטרות נוספות של הניסוי זן בדיקת סבילות הטיפול וזן בחינה ראשונית של יעילות הטיפול בקרב תחו' גידולי ראש – צוואר**	https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05200050?term=CLPR-001&draw=2&rank=1		Phase I
0740-22	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid Tumors and Lymphomas	קו שני שמחלתם התקדמה בזמן טיפול קודם	מחקר שלב 1, בתווית פתוחה, עם העלאת מינון והרחבת מינון להערכת הבטיחות, הסבילות, הפרמקוקינטיקה והיעילות נגדת הגידול של PF-07799933 (ARRY-440) כמונו יחיד ובטיפול משולב במטופלים עם גידולים מוצקים מתקדמים בר 16 ומעלה עם גידולים מוצקים שסוללים שינוים בגן BRAF	C4761001	**לחקור את הבטיחות, הסבילות, הפרמקוקינטיקה, הפרמקודינמיקה והתגובה הקלינית המוסמראלית של PF-07799933 כשהיא ניתנת כמונו יחיד ובשילוב עם מקבוק® (BIMEKTOVI®) ביניסיניב (BINIMETINIB)®, או ארבטיקס® (BERBETUX)® אנקוראפנב (ENCORAFENIB)® בקרב המשתתפים עם גידולים מוצקים שסוללים שינוי מסוים ב BRAF II ו- BRAF, עם ולא מעורבות של המוח.**	https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05355701?term=C4761001&draw=2&rank=1		Phase I
0029-23	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	לאחר טיפול מקובל קודם	מחקר פאזה IIb בתווית פתוחה, רב-מרכזי, למציאת מינון להרחבת מוצדים HRO761 כמכשיר יחיד ובשילובים במטופלים עם גידולים סוליידים מתקדמים עם אי איבות מיקרוסטליטים בגוהה או חסרי תיקון אי התאמות	CHRO761A12101	**לאמין את הבטיחות והסבילות של HRO761 כמכשיר יחיד (s.a) ובשילוב עם טרמטליזומאב או אירינוטקאן, ולקבוע את המינון(ים) והמשטר(ים) המומלץ(ים) עבור HRO761 כמכשיר יחיד (s.a) ובשילוב עם טרמטליזומאב או אירינוטקאן.**	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05838768?term=CHRO761A12101&rank=1		Phase I
0620-23	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	אין הגבלת קווים.	מחקר פאזה 1 להערכת הבטיחות והסבילות של GS-0201 כמונותרפיה ובשילוב במבוגרים עם גידולים מוצקים מתקדמים	GS-US-686-6854	**מחקרים ב' ו-ב' • להעריך את הבטיחות והסבילות של GS-0201 בשילוב עם מקרוטוזומב בנוקטקן במשתתפים עם גידולים מוצקים בשלב מתקדם בהתוויות נבחרות. • לאתר את המינון הבדרי המסבל ו/או את המינון המומלץ לשלב 2 של GS-0201 בשילוב עם סקטוזומב ובנוקטקן במשתתפים עם גידולים מוצקים בשלב מתקדם בהתוויות נבחרות. מחקרים ב' ו-ב' • להעריך את הבטיחות והסבילות של GS-0201 בשילוב עם מקרוטוזומב בנוקטקן במשתתפים עם גידולים מוצקים בשלב מתקדם, שיש בהם ליקויים מולקולרים בגנים של מסגנון הרקומבינציה ההומולוגית לתיקון גנים. • לאתר את המינון הבדרי המסבל ו/או את המינון המומלץ לשלב 2 של GS-0201 הניתנת כטיפול יחידני למשתתפים עם גידולים מוצקים בשלב מתקדם שיש בהם ליקויים מולקולרים בגנים של מסגנון הרקומבינציה ההומולוגית לתיקון גנים.**	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06162177?term=GS-US-686-6854&rank=1		Phase I
0589-23	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	קו שלישי	מחקר שלב 1, המערך בפעם הראשונה בבני אדם: M21-404, להערכת הבטיחות, הפרמקוקינטיקה והיעילות של ABBV 400 בנבדקים בוגרים עם גידולים מוצקים מתקדמים	M21-404	**(RP2D) ולקבוע את המינון המומלץ לשלב 2 ABBV-400 להערך את הבטיחות, הסבילות והפרמקוקינטיקה של • הניתנת כטיפול יחידני ABBV-400 • בנבדקים עם גידולים מוצקים מתקדמים הכאים ABBV-400 להערך את היעילות של, שאינם קשקשי מתקדם NSCLC, קשקש מתקדם NSCLC, GEA, ו- CRC • בנבדקים עם גידולים מוצקים המאופיינים ע"י ביטוי ABBV-400 להערך את היעילות של c-Met**	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05029827?term=M21-404&rank=1#locations		Phase I

0171-23	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid Tumors and Lymphomas	מיצוי קווים	ניסוי בתווית-פתוחה, פאזה 1, ראשון בבני אדם, המולל העלאת והרחבת מינונים, להערכת הבטיחות, הסבילות, המינון המרבי הנסבל של הניתן, פרמקוקינטיקה, פרמקודינמיקה ופרופיל תגובה לניתול של מעכב דיאציל‌גליצרול קינאז אלפא BAY (DGKα) 2862789 בשותפים עם גידולים מוצקים מתקדמים.	22231	בשותפים עם גידולים מוצקים מתקדמים BAY 2862789 לקבוע את הבטיחות והסבילות של • (RP2D) בשותפים עם המינון המומלץ לשלב 2 (MAD), או המינון המרבי הניתן (MTD) לקבוע את המינון המרבי המרבי • עם גידולים מוצקים מתקדמים פומי BAY 2862789 של PK-לאיין את ה •	https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT05858164?term=22315&checkSpel=false&rank=1	
0238-24	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	קו שני ומעלה	מחקר שלב 1, רב-מרכזי, בתווית פתוחה, להערכת הבטיחות, הסבילות, המינון המרבי הנסבל והתרופות הראשונית של לטצרים 177 מצמוד ל NNS309 בחולים עם סרטן לבלב, סרטן ריאות, סרטן של וסרטן המעי הגס והחלחולת	CFXX489A12101	מטרת מחקר זה היא להערך את הבטיחות, הסבילות, רמת המינון המרבי הנסבל (דז'ומטרה) שאת היעילות הראשונית של לטצרים 177 מצמוד ל NNS309 בחולים עם סרטן לבלב, סרטן ריאה, סרטן אדנוקרצינומה של צינורות הלבלב, סרטן ריאה סמוא תאים שאינם קטנים, סרטן של רוקמי ולבלאר מסוג HR+/HER2- , סרטן שד שלילי לשלושת המפנים סרטן המעי הגס והחלחולת, מתקדמים מקומית או גרורתיים.	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06274437?term=BND-35-001&rank=1#locations	
0648-23	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid Tumors and Lymphomas	מיצוי קווים	מחקר שלב 1 עם העלאת מינון שאופטימיזציה של מינון להערכת הבטיחות, הסבילות ופעילות נגדת הגידול של BND-35 בנתון לבד ובשילוב עם ניבולומאב אם עם סוקוטימאב בחולים עם גידולים מוצקים מתקדמים.	BND-35-001	כשניתן לבדו או בשילוב עם ניבולומאב או עם סוקוטימאב BND-35 להערך את הבטיחות והסבילות של. 1 כשניתן לבדו או בשילוב עם BND-35 (MAD) או המינון המרבי שניתן (MTD) לקבוע את המינון המרבי הסבול. 2 ניבולומאב או עם סוקוטימאב	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06274437?term=BND-35-001&rank=1#locations	
0640-23	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	קו שני ומעלה	מחקר שלב 1, רב-מרכזי, בתווית פתוחה להערכת הבטיחות, הסבילות,קבעת המינון (רמת הקרינה) והפעילות הראשונית של לטצרים 177 ממצמד EVS459-לחולים עם סרטן שחלתי וסרטן ריאות	CGIZ943A12101	A phase I, open-label, multi-center study to evaluate the safety, tolerability, dosimetry, and preliminary activity of [177Lu]Lu-EVS459 in patients with ovarian and lung cancers.	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06379293?term=CGIZ943A12101&rank=1	
0121-23	פרופ גבע	Phase I Advanced Solid/Metastatic Tumors	קו שני -שלישי	מחקר שלב 1, רב-מרכזי, בתווית פתוחה להערכת הבטיחות, הסבילות, רמת הקרינה והפעילות הראשונית של לטצרים 177 ממצמד ל- 5BFF בחולים עם גידולים מוצקים מתקדמים נבחרים.	CAAA604A12101	מטרת מחקר זה היא להערך את הבטיחות וגיעילות של לטצרים 177 ממצמד ל-FFS8 FFS8 ([177Lu]Lu-FFS8) בחולים בני 18 ומעלה עם אונקוגרטונום מתקדמת מקומית של גידולים 68 ממצמד ל-FFS8 ([68Ga]Ga-FFS8) בחולים בני 18 ומעלה עם אונקוגרטונום מתקדמת מקומית של לטצרים 177 הלבלב (PDAC) שאינה ניתנת לכריתה או גרורתית, אדנוקרצינומה מקומית של הקיבה והושאם (GEA) שאינה ניתנת לכריתה או גרורתית, או גליאבלאסטומה מולטיפורמה (GBM) נשנית.	https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05977322?term=CAAA604A12101&draw=2&rank=1	
0477-23	פרופ גבע	Phase II Advanced Solid Tumors and Lymphomas	קו שני	מחקר שלב 1 גלוי תווית להערכת היעילות והבטיחות של ABBV-400 בהתוויות בחולים עם גידולים מוצקים בשלב מתקדם	M24-427	יעילות: להערך את היעילות של ABBV-400 כבל אחת מהתוויות הבאות של גידולים מוצקים: סרטן כבד ראשוני (HCC), סרטן דרכי הנשיפה (BTC), אדנוקרצינומה של צינור הלבלב (PDAC), סרטן קשקש בושאם (ESCC), סרטן של (BC) שליל לשלושת המפנים (TN), BC חיובי ל-human epidermal growth factor receptor 2-(HER2-)שליל ל-hormone receptor-(HR+) חיובי ל-(HER2-) וקרצינומה של ראש קשקש בראשאי (HNSCC), בשלב מתקדם או גרורתיים בהיותו. לאיין את הבטיחות והבטלות של ABBV-400 טיפול יחידי ב-HCC, BTC, PDAC, ESCC, TNBC, HER2- BC, HR+ ל- HNSCC, מתקדמים מקומית או גרורתיים.	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06084827?term=M24-427&rank=1	
0158-24	פרופ גבע	Phase II Advanced Solid Tumors	קו שני ומעלה	מחקר רב-מרכזי, פאזה 2a, בתווית גלוי, של טיפול בפרופיטל בחולים עם גידולים מוצקים המקושרים למוטציות מדקות, אשר התקדמו לאחר טיפול קו ראשון (PROM-2301)	PROM-2301	להערך את היעילות של פרופיטל נגד הגידול בחולים עם סרטן מתקדם של הלבלב או השחלות עם מוטציות מדקות (גנים המקושרים ל BRCA1, BRCA2 או HRD)	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06478827?term=PROM-2301&rank=1#locations	
0360-24	פרופ גבע	Phase II /Phase I Advanced Solid Tumors	קו שני	מחקר שלב 1/2 להערכת הבטיחות ויעילות של פטרטומאב דרוקסטקן (Patritumab Deruxtecan) בחולות סרטן של מערכת העיכול (MK-1022-011).	MK-1022-011	(HER3-DXd) להערך את הבטיחות והסבלות של פטרטומאב דרוקסטקן • המאומתות בהתאם לבטיחה 1.1 של הקריטריונים להערכת התגובה (ORR) להערך את שיעור התגובה האובייקטיבית • של על-ידי סקירה מרכזית בלתי תלויה תוך שימוש המפתיע (RECIST 1.1) בגידולים מוצקים (BICR) (בתקבה (RP2D) 3 קוקבה 1, עוקבה 2 נשתתפים שקבלו את המינון המומלץ הראשוני לשלב 2)	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06274437?term=BND-35-001&rank=1#locations	
0746-21	ד"ר שרון פלס	GEJ + קיבה	קו 1	מחקר שלב 1b/3 על באמריזומאב (Bemarituzumab) בשילוב עם כימותרפיה וניבולומאב לעומת כימותרפיה וניבולומאב בלבד בנבדקים עם סרטן בקיבה ובחיבור קיבה-ושט עם ביטוי יתר של FGFR2b, בשלב מתקדם ושלא טופל בעבר (FORTITUDE-102)	20210098	להשווה את היעילות של באמריזומאב + mFOLFOX6 + ניבולומאב לעומת פלבגו + mFOLFOX6 + ניבולומאב בפי שיעורן לפי ההשרדות הכוללת	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05111626?term=20210098&draw=2&rank=1	GI
0591-22	ד"ר שרון פלס	GEJ + קיבה	קו 1	ניסוי שלב 3 בהקשה אקראית של דומבגלומאב, זיבבגלומאב וכימותרפיה לעומת ניבולומאב וכימותרפיה בנבוגרים עם אדנוקרצינומה מתקדמת בדרכי העיכול העליונות	STAR-221	להשוות בין הישרדות הכללה של דומבגלומאב (domvanalimab) בהקשר דומבגלומאב (zimberelimab) וכימותרפיה לבין זו של בלבד דומבגלומאב (domvanalimab) בהקשר כימותרפיה בקבוצת המטופלים עם ביטוי גבוה של PD-L1	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05568095?intr=A%20Randomized,%20Open-Label,%20Multicenter,%20Phase%203,%20Trial%20of%20Domvanalimab,%20Zimberelimab,%20and%20Chemotherapy%20Versus%20Ipilimumab%20and%20Chemotherapy%20	GI
0542-23	פרופ גבע	גידולים נוירואנדוקרינים של מערכת העיכול ומחלת RCC, VHL	קו ראשון ,שני ,או שלישי	מחקר שלב 2 להערכת היעילות והבטיחות של טיפול חד תרופתי בבלוטיניב (MK-6482, לשעבר PT2977) בנחבדים עם פיאוכרומוציטומה/פאראגנגליומה מתקדמת (PPGL), גידול נוירואנדוקרינ בלבלב (pNET), גידולים הקשורים למחלת פון היפל-לינדאו (VHL), גידול מתקדם ברקמת הכליה של מערכת העיכול (wt GIST) אי גידולים מוצקים מתקדמים עם שינוים גנטיים הקשורים ל- HIF-2α (MK6482-015)	MK6482-015	הערך את שיעור התגובה הכולל של בלוטיניב על פי קריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים (RECIST) גרסה 1.1 באמצעות סקירה מרכזית בלתי תלויה סמויה (BICR)	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04924075?term=MK6482-015&rank=1#locations	GI
0397-23	פרופ גבע	CRC	קו שני	להערכת הבטיחות, היעילות, המינון המיטבי של ABBV-400 בשילוב עם פלוראוראציל, חומצה פולינית וניומאצימאב בנבדקים עם סרטן המעי הגס והחלחלת בגרורתי שאינם מתאים לכריתה כירורגית, אשר טופל בעבר	M24-311	זרוע 1ב: להערך את שיעור התגובה הכולל של בלוטיניב בהתאם לקריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים גרסה 1.1 לפי סקירה מרכזית בלתי תלויה סמויה ב-PPGL הקשור למחלת VHL	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06107413?term=M24-311&rank=1	GI
0226-22	פרופ גבע	CRC	קו ראשון	מחקר אימוץ קלי ראשון בסרטן המעי הגס והחלחלת לחיזוי הישנות המחלה באמצעות תבנית DNA של הגידול בחתזר הדם לאיתור מחלה אפרארית מינימלית	202228256	יקריות: • לאמת את הקשר בין תוצאה חיובית בבדיקת cIDNA לאחר הטיפול הדפיניטיבי ובמעקב טרום-הנישאות לבין RFI. מטרות: • להערך את הרגישות והסגולות של חיבות ל-cIDNA בקשר להישנות קלינית לאחר מכן. • להערך את הקשר בין תוצאות ה-cIDNA בנקודת החתלה שלאחר הניתוח, לאחר הטיפול הדפיניטיבי, במעקב טרום-הנישאות אחר RFI ללא תלות בתכונות הסיכון הקליניות-פתולוגיות ובתערכות CEA סדרתיות בסרום לבין הסיכון להישנות כפי שמוערך באמצעות ניקוד הנישאות. • להערך את הזמן מקבלת תוצאה חיובית של cIDNA עד להישנות קלינית בנבדקים עם תוצאת cIDNA חיובית. אוקספלטיבים: • לתאר את ה-RFI עבור כל אחת מהקבוצות הבאות: cIDNA: +/+ o חיובי בנקודת החתלה וחיובי באחד או יותר מביקורי המעקב. cIDNA: +/- o חיובי בנקודת החתלה וחיובי באחד או יותר מביקורי המעקב. cIDNA: -/+ o שלילי בנקודת החתלה וחיובי באחד או יותר מביקורי המעקב. cIDNA: -/- o שלילי בנקודת החתלה שלילי לאורך יתרת תקופת המעקב. • להשוות את ה-RFI בין מטופלים עם תוצאה שלילית של cIDNA לבין מטופלים עם תוצאה חיובית של cIDNA לאחר כימותרפיה משלימה, בקרב המטפלים בכימותרפיה משלימה שאין להם תוצאה חיובית של cIDNA לאחר הניתוח. • לתאר את הזמן עד להתקדמות (או הישנות שנייה, אם הישנות הראשונה הייתה אוליגומטסטיס שניתן לתחזן), במטופלים עם מוטציות הרלוונטי לטיפול לעומת מטופלים ללא מוטציות הרלוונטי לטיפול שנמצאו באמצעות תוצאות ה-CGP, ולתאר טיפולים שניתנו למטופלים אשר קיבלו את הבדיקה לפי מרשם קליני. • לבחון את הבדלים בין תוצאות ה-CGP ברקמה הראשונית לעומת התוצאות בדקמה נשית. • להערך את הקשר בין תוצאות ה-cIDNA בנקודת החתלה שנמדדו 14 עד 28 ימים לאחר הניתוח לבין RFI, בהשוואה לתוצאות שנמדדו לאחר 29 ימים או יותר. • להערך את הרגישות והסגולות של חיבות ל-cIDNA בנקודות זמן פרטניות (למשל, לאחר הניתוח, לאחר	https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=First+CDKPedatr+cancer+clinical+validation+study+to+predict+RECurrence+using+Circulating+Tumor+DNA+assay+to+detect+Minimal+Residual+Disease&cntry=&state=&city=&dist=	GI
0043-24	ד"ר שרון פלס	קיבה ,ושט ,מעבר ושט קיבה	קו שלישי ומעלה	מחקר שלב 3 רב מרכזי, גלוי תווית, אקראי להשוואת היעילות והבטיחות של MK-2870 לעומת טיפול לבחירת הרופא בקו הטיפול השלישי ומעלה, באדנוקרצינומה בשלב מתקדם/גרורתית בקיבה הושאם (אדנוקרצינומה בקיבה, אדנוקרצינומה בחיבור קיבה-ושט ואדנוקרצינומה בושאם)	MK-2870-015	להשוות את MK-2870 לטיפול לבחירת הרופא (TPC) מבחינת ההישרדות הכוללת (OS)	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06356311?term=MK-2870-015&rank=1#locations	GI
0293-21	פרופ גבע	ושט	קו שני	להערך את הבטיחות ואת הסבילות של הטיפול המשולב – (pembrolizumab) ובלנטיניב (lenvatinib), בפמברוליזומאב (zanidatamab) ובבלוטיפיב (belzutifan).	MK6482-016	זרוע 1ב: להערך את שיעור התגובה הכולל של בלוטיפיב על פי קריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים גרסה 1.1 לפי BICR הקשור לפחלת pNET-ב VHL	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04976634?term=MK6482-016&draw=2&rank=1	GI
0664-23	פרופ רזית גבע	BTC GBC ICC ECC	קו ראשון	נישוי גלוי תווית, אקראי, על היעילות והבטיחות של זנידאטאמאב בשילוב עם טיפול מקובל בטוחה יעילה בטיפול לסרטן דרכי המרה (BTC) שהוא חיובי ל-HER2, מתקדם מקומית, שאינו ניתן להסרה בניתוח או גרורתי בהשוואה לטיפול מקובל בלבד.	JZP598-302	מטרת המחקר העיקרית היא לבחון אם זנידאטאמאב בשילוב עם טיפול מקובל בטוחה יעילה בטיפול לסרטן דרכי המרה (BTC) שהוא חיובי ל-HER2, מתקדם מקומית, שאינו ניתן להסרה בניתוח או גרורתי בהשוואה לטיפול מקובל בלבד.	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06282575?term=JZP598-302&rank=1#locations	GI
0591-23	ד"ר קיימן	Prostate ערמונית	קו ראשון	מחקר שלב 3 אקראי, גלוי תווית על MK-5684 לעומת טיפול חלוני באבירטרון אצטט או באבלומיפד בשותפים עם סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס (mCRPC) שהתקדם במהלך קבלת טיפול קודם בחתיפה הורמונלית אחת מהדור הבא (NHA) או לאחר מכן	MK5684-004	להשוות את הטיפול ב-MK-5684 לטיפול החלוני באבירטרון אצטט או באבלומיפד, מבחינת הישרדות ללא התקדמות של המחלה לפי בדיקה רדיולוגית (rPFS) בהתאם לקריטריונים להערכת התגובה בגידולים מוצקים, גרסה 1.1, שהותאמו על ידי קבוצת העבודה לסרטן הערמונית (PCWG) (להלן) "הקריטריונים PCWG-Modified RECIST 1.1" לפי סקירה מרכזית בלתי תלויה תוך שימוש הסמיות (BICR), במשתתפים עם mCRPC	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06136692?term=MK5684-004&rank=1#locations	GU
0411-23	ד"ר קיימן	firsr /initial biochemical progression	Prostate ערמונית	מחקר שלב 3, כיוולאום, רב-מרכזי, פרספקטיב (קדימוני), בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית, המשווה את הטיפול בלוטציום 177 ויפיבוויד טטראקסטן (AAA617) אל מול מעקב, על עיכוב הסיום או היאמות המחלה בחולים בגורים עם סרטן ערמונית בעל גרורות מעטות (אוליגומטסטיס) החייב לאנטיגן ממברנה ספציפי לערמונית (PSMA), עם גנו אחד עד חמישה נגעים גרורתיים שזוהו על ידי סריקת שומנפיריה ע"י פדיוטרוקמבוסטת אנטיגן ממברנה ספציפי לערמונית (PSMAPET) באמצעות גלים 68 גוזוביוויד (AAA617) או פיפלמלוטסאט השלילים לחחלה ברמה M1 לפי בדיקת דיפוות קונבנציונלית.	CAAA617D12302	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05939147?term=CAAA617D12302&rank=1	GU

0671-20	ד"ר דוד שריד	Prostate ערמונית	קו שני	התערבות אקראית בנתרי הסיכון למחלה קרדיוטוקסלרית וגורמי סיכון הקשורים לארית חיים במטופלים עם סרטן הערמונית.	RadicalPC	לבדוק אלו גורמים אצל גברים עם סרטן הערמונית המקבלים טיפול להפחתת אנדרוגנים, מעלים את הסיכון (1 ללקות במחלת קרדיוטוקסלרית.	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03127637?term=RadicalPC&draw=2&rank=21	GU
0565-23	ד"ר דוד שריד	RCC	קו שלישי	מחקר שלב 1/2 רב מרכזי, גלוי תווית, אקראי על טיפול בבלוזטיניב בשילוב עם פלבוציקליב לעומת טיפול בבלוזטיניב בלבד בנשאים עם סרטן תא הכליה בשלב מתקדם (MK-6482-024)	MK-6482-024	חלק 1: להעריך את הבטיחות והסבילות בבדי להמליץ על מינון לאפיה שנייה של בלוזטיניב בשילוב עם פלבוציקליב	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05468677?term=MK-6482-024&rank=1#contacts-and-locations	GU
0237-22	ד"ר סריד	Urothelium שלפוחית שתן	קו 2/3	מחקר קליני שלב 2 רב-מרכזי, בתווית פתוחה, עם עקבות מרובות להערכת היעילות והבטיחות של דיסיטמאב וזוסין (RC48-ADC) בנבדקים עם קרצינומה של תאי אורותל גדרתית שאינה מתקדמת מקומית שאינה ניתנת לכריתה המבטאת HER2	RC48G001	חלק 2: להעריך את התגובה האוביקטיבית לטיפול (ORR) ע"י RECIST	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04879329?term=RC48G001&draw=2&page=1	GU
0092-22	ד"ר דניאל קייזמן	Urothelium שלפוחית שתן	Neoadjuvant	מחקר של TAR-200 בשילוב עם סטרלימאב וסטרלימאב לבדה במשתתפים עם קרצינומה של תאי האורותל המודרנית לשריר בשלפוחית השתן, שמתוכננים לעבור כריתה מלאה של השלפוחית ואינם מתאימים עם מסרבים לקבל כימותרפיה נאואדג'ובנטית מבוססת פלטינום.	70001139BLC2002	המטרה העיקרית היא לקבוע את השפעות נוגדות הגידול של TAR-200 בשילוב עם סטרלימאב (cetrelimab) ושל סטרלימאב לבדה, בהערכה לפי תגובה פתולוגית מלאה (pCR) בכריתה מלאה של שלפוחית השתן (RC). המטרות המשניות הן להעריך את הבטיחות ואת הישרדות ללא הישנות המחלה (RFS) בקרב משתתפים המקבלים TAR-200 בשילוב עם סטרלימאב וסטרלימאב לבדה.	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04919527?term=70001139BLC2002&draw=2&rank=1	GU
0658-23	ד"ר סריד	Urothelium שלפוחית שתן	קו ראשון /שני	מחקר שלב 2/3 אקראי, גלוי תווית על BT8009 בטיפול יחיד או בטיפול משולב בקרב נבדקים עם תא אורותל מבכר של שלפוחית השתן מתקדם מקומית או גרורתי (Duravelo-2)	BT8009-230	מטרות הניסוי (עיקריות): עקבה 1: להעריך את היעילות של BT8009 בשילוב עם סבריליזומאב, לפי ההישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS) בהתאם לגרסה 1.1 של הקריטריונים להערכת התגובה בגידולים מוצקים (RECIST 1.1) באמצעות סקירה מרכזית בלתי תלויה תוך שימור המסתרת (BICR). עקבה 2: להעריך את היעילות של BT8009 בניסוי יחיד או בשילוב עם סבריליזומאב, לפי שיעור התגובות האוביקטיבית (ORR) בהתאם לקריטריונים RECIST 1.1 באמצעות BICR.	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06229596?term=BT8009-230&rank=1#locations	GU
0308-21	ד"ר קיזמן	Urothelium שלפוחית שתן	Neoadjuvant	מחקר שלב 3, רב-מרכזי, בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית לקבוצת היעילות והבטיחות של דורבלומאב בשילוב טרמלימומאב אמגרטומאב וזוסין או דורבלומאב בשילוב אמגרטומאב וזוסין בטיפול קדם-ניתוחי במטופלים שאינם מתאימים לקבלת ציספלטין ועוברים כריתה מלאה של השלפוחית עקב סרטן שלפוחית השתן המודר לשריר (VOLGA)	D910PC00001	(Enfortumab Vedotin, EV) והישרדות מטלת הארעיים pCR-בלים לכריתת שלפוחית השתן מבחינת שיעור (EFS) • (durvalumab) להשוות את היעילות של דורבלומאב + (tremelimumab) טרמלימומאב + (enfortumab) אנפורטומאב וזוסין	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04965709?term=D910PC00001&draw=2&rank=1	GU
0695-22	ד"ר סריד	Urothelium שלפוחית שתן	קו 1	מחקר שלב 3, מבוקר, בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית של דיסיטמאב וזוסין בשילוב עם סבריליזומאב לעומת כימותרפיה לבדבקים עם קרצינומה של תאי אורותל גרורתית או מתקדמת מקומית שלא נטופלה בעבר ומבטאת HER2 (1+IHC ומעלה)	SGNDV-001/KN-D74	להשוות את היעילות של דיסיטמאב וזוסין (disitamab vedotin) בשילוב עם סבריליזומאב (pembrolizumab) לכימותרפיה טיפול קו ראשון במטופלים עם קרצינומה מתקדמת של תאי אורותל המבטאת HER2 (1+ IHC ומעלה)	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05911295?term=SGNDV-001&rank=1#locations	GU
0705-19	ד"ר סריד	Urothelium שלפוחית שתן	MIBC CRT+Pembro vs. CRT alone	מחקר קליני שלב 3, אקראי, כפול סמיות, ובביקורת פלצבו לבדיקות היעילות והבטיחות של סבריליזומאב (MK-3475) בשילוב עם כימותרפיה (CRT) לעומת CRT בלבד, בקרב משתתפים עם סרטן שלפוחית השתן שתחר לשריר (MIBC) (KEYNOTE-992)	MK3475-992	● בקרב עוקבה א' (מטופלים עם גידולים עם אימונוהיסטוכימיה [IHC] של HER2 3+ או IHC 2+ עם היבריידיצה מקומית [ISH]+).	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04241187?term=MK3475-992&draw=2&rank=1	GU
0112-24	ד"ר עבר פינקל	ראש צוואר Head & Neck	קו שני	מטרת מחקר זה היא לגלות אם תרופת מחקר בשם דוסטארלימאב הניתנת במהלך שנה אחת החל מזמן קצר לאחר סיום טיפול CRT (כימורדיותרפיה), יכלה לעכב או להמתיח את הסיכון לחזרת סרטן בהשוואה לפלבו שניתן באותו פרק זמן לאחר טיפול CRT	221530	דוסטארלימאב (Dostarlimab) כטיפול דיפיי לאחר כימורדיאציה במשתתפים עם קרצינומת תאי קשקש מתקדמת בראש ובצוואר שלא נכרתה	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06259588?term=221530&rank=1#locations	H&N
0562-21	ד"ר אורית גוטפלד	ראש צוואר Head & Neck	קו 1	מחקר שלב 3 (שלב מכריע) של NBTXR3 המפעלת על ידי רדיותרפיה בלבד או רדיותרפיה בשילוב עם צטוקסמאב לפי בחירת החוקר במטופלים קשישים עם קרצינומה מתקדמת מקומית של תאי קשקש בראש ובצוואר שאינם מתאימים לקבלת כימותרפיה מבוססת פלטינום.	NANORAY-312	להעריך את תוצאות הישרדות בנבדקים שטופלו ב-NBTXR3 בהתרקה תוך-גידולית, המופעלת על ידי רדיותרפיה בלבד, בהשוואה לבחירת החוקר בלבד, בקרב נבדקים עם קרצינומה מתקדמת מקומית שלא נטופלה בעבר ומבטאת HER2 (1+IHC ומעלה)	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04492173?term=NANORAY-312&draw=2&rank=1	H&N
0065-24	ד"ר עבר פינקל	ראש צוואר Head & Neck	קו שני ואילך	מחקר שלב 3 גלוי תווית, אקראי, מבוקר. להערכת היעילות והבטיחות של פטוסמטמאב (petosemtamab) בהשוואה לטיפול מומחרני לבחירת החוקר, במטופלים עם סרטן הראש והצוואר של תאי קשקש, גרורתי/נשנה, שאינם ניתן לריפוי.אשר טופלו בעבר	MCLA-158-CL02	לפי גרסה 1.1 של (ORR) להשוות את הפעילות נגד גידולים מבחינת שיעור התגובות האוביקטיביות (שהוערכו באמצעות סקירה מרכזית, (RECIST, הנחיות הקריטריונים להערכת התגובה בגידולים מוצקים גרורתי/נשנה שאינו ניתן לריפוי שמחלתם HNSCC בלוח-מלווה תוך שימור המסתרת בקרב מטופלים עם וטיפול המכיל פלטינום או אחרתם ומקבלים טיפול מומחרני PD-1 המקדמה במהלך טיפול נגד בפטוסמטמאב, לבין הפעילות במטופלים דומים המקבלים טיפול מומחרני לבחירת החוקר • גרורתי/נשנה שאינו ניתן לריפוי שמחלתם HNSCC של מטופלים עם (OS) להשוות את התרשרות הכוללת וטיפול המכיל פלטינום או אחרתם, ומקבלים טיפול מומחרני PD-1 המקדמה במהלך טיפול נגד של מטופלים דומים המקבלים טיפול מומחרני לבחירת החוקר OS-בפטוסמטמאב, לבין ה	https://clinicaltrials.gov/study/NCT03526835?term=MCLA-158&rank=1#locations	H&N
0140-24	ד"ר עבר פינקל	ראש צוואר Head & Neck	קו ראשון	מחקר שלב 3 גלוי תווית, אקראי, להערכת היעילות והבטיחות של פטוסמטמאב (petosemtamab) בשילוב עם מסבריליזומאב לעומת מסבריליזומאב בסרטן הראש והצוואר של תאי קשקש חוזר PD-L1+ בקרב הטיפול הראשון במחלה נשנית או גרו	MCLA-158-CL03	גרורתי/נשנה שאינו ניתן לריפוי HNSCC-אחרי קו הטיפול הראשון ל (OS) להשוות את התרשרות הכוללת עם גידולים המבטאים את (pembrolizumab). בטופולים המתאימים לטיפול מומחרני במסבריליזומאב PD-L1 לפי הארח הכולל של תאים המבטאים programmed cell death protein ligand 1 (PD-L1) בין הטיפול הראשון בקרב הנבדקים אשר מטופלים בפטוסמטמאב בשילוב עם מסבריליזומאב או במסבריליזומאב בלבד, 1 ≤ L1 [CPS] בהתאם לגרסה 1.1 של הקריטריונים להערכת התגובה (ORR) להשוות את שיעור התגובה האוביקטיבית בגידולים מוצקים (RECIST 1.1), באמצעות סקירה מרכזית בלתי תלויה תוך שימור המסתרת (BICR), אחרי PD-L1 ≤ 1, בטופולים המתאימים לטיפול מומחרני HNSCC-קו הטיפול הראשון ל אשר מטופלים בפטוסמטמאב בשילוב עם (CPS1 ≤), PD-L1 כמסבריליזומאב, עם גידולים המבטאים מסבריליזומאב או במסבריליזומאב בלבד	https://clinicaltrials.gov/search?term=MCLA-158-CL03	H&N
0637-22	פרופסור בלמנטל	glioma	לאחר טיפול קו ראשון בקרינה	מטרה עיקרית – להערך את היעילות של ONC201 הניתנת אחרי טיפול בקרינה למשתתפים עם גליומה דיפוזית עם המוטציה H3 K27M	ONC201-108	ONC201 לטיפול בגליומה דיפוזית (diffuse) שאובחנה לאחרונה עם המוטציה H3 K27M, לאחר השלמת טיפול בקרינה: מחקר רב-מרכזי, אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05580562?term=ONC201-108&draw=1&rank=1	brain
0502-23	ד"ר סין שמאי	ריאה Lung	קו ראשון	עוזרת BI 1810631 מחקר לבדיקה אם Beamion LUNG-2: לאנשים עם סרטן ריאות מתקדם מסוג תאים לא-קטנים עם בהשוואה לטיפול המקובל HER2 מוטציות	1479-0008	המטרה העיקרית של הניסוי היגה להראות עליונות של זוצרטיניב (BI 1810631) על פי הטיפול המקובל (מסבריליזומאב יחד עם כימותרפיה פלטינום-פמטרקסד) בהתבסס על יחס הסיכון של PFS (הישרדות ללא התקדמות המחלה) בקרב חולים שאובחנו עם NSCLC לא קשקשי, מתוצר היסטולוגית, בלתי ניתן לכריתה, מתקדם מקומית או גרורתי, עם מוטציות HER2 TKD שלא קיבלו טיפול מערכתי כלשהו בפרוגנוזה זה.	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06151574?term=1479-0008&rank=1#locations	Lungs
0476-23	פרופ' מרימסקי	ריאה Lung	קו שני/שלישי	מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה, להערכת SGN-B6A לאמאה לזיסטקטל בנבדקים בגיים שסובלים מסרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים שטופל בעבר	SGNB6A-002	לבין זרוע הביקורת (דוסטקטל) (SGNB6A) בין הדרוע הניסויית (OS) להשוות את התרשרות הכוללת + בין (BICR), כפי שתוערך על ידי סקירה מרכזית עצמאית בספירות (ORR) להשוות את שיעור התגובה האוביקטיבית - הדרוע הניסויית הרוע הביקורת	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06012435?term=SGNB6A-002&rank=1#locations	Lungs
0661-23	ד"ר סין שמאי	ריאה Lung	קו שני	מחקר שלב 3 רב מרכזי, אקראי, כפול סמיות, בביקורת פלצבו על הטיפול בטרלימאב בנבדקים עם סרטן ריאות מסוג תאים קטנים בשלב מוגבל (LS-SCLC) שמחלתם לא התקדמה אחרי טיפול משולב כימותרפיה ובקרינה (DeLLphi-306)	20230016	להשוות את היעילות של טרלימאב למלבבו, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהישרדות ללא התקדמות של המחלה בהתאם לגרסה 1.1 של הקריטריונים להערכת התגובה בגידולים מוצקים (RECIST 1.1), שנבחנו באמצעות סקירה מרכזית בלתי תלויה תוך שימור המסתרת	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06117774?term=20230016&rank=1#locations	Lungs
0353-23	פרופ' מרימסקי	ריאה Lung	קו שני	מחקר בהקצאה אקראית של שני משטרי מינון שונים של תרופת המחקר, אדגרביב (400 מ"ג פעמיים ביום עם אוכל +600 מ"ג פעמיים ביום ללא קטר למזון). במטופלים עם סרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים שאינו ניתן לכריתה, מתקדם מקומית או גרורתי בעל מוטציה KRAS G12C שקיבלו טיפול של משטר כימותרפיה מבוסס פלטינום ומעבר נקודת בקרה חיסונית.	849-021	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05853575?term=849-021&rank=1#locations	Lungs
0546-23	ד"ר סין שמאי	ריאה Lung	קו ראשון	מחקר פאזה 3/b/II, בתווית-פתוחה, רב-מרכזי, להערכת הבטיחות, הפעילות והפרמקוקינטיקה של GDC-6036 בשילוב עם טיפולים אחרים כגון סרטן. במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) מתקדם או גרורתי עם מוטציה KRAS G12C שלא קיבלו טיפול קודם.	BO44426	להעריך את הבטיחות והסבילות של GDC-6036 בשילוב עם מסבריליזומאב	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05789657?term=BO44426&rank=1#locations	Lungs
0594-23	ד"ר סין שמאי	ריאה Lung	קו שני	מחקר פאזה 3, בתווית פתוחה, אקראי, מבוקר, נלובלי עם טליסוזומאב וזוסין (ABBV-399) לעומת דוסטקטל בחולי סרטן ריאה מקומי מתקדם/גרורתי מסוג תאים שאינם קטנים ושאינם מסוג תאי קשקש עם ביטוי יתר של c-Met, EGFR שקיבלו טיפול קודם,Wildtype	M18-868	היעדים המשניים העיקריים הינם לבחון עליונות של זוצרטיניב (BI 1810631) על פי הטיפול המקובל במונחים של ההבדל בתגובה אובייקטיבית (OR), להראות עליונות של זוצרטיניב (BI 1810631) על פי הטיפול המקובל בהתבסס על השיטה מנקודת התחלה בשבוע 25 בציון הכולל של NSCLC SAQ, להראות עליונות של זוצרטיניב (BI 1810631) על פי הטיפול המקובל בהתבסס על יחס הסיכון של הישרדות כוללת (OS).	https://clinicaltrials.gov/study/NCT04928846?term=M18-868&rank=1#locations	Lungs
0517-22	ד"ר סין שמאי	ריאה Lung	קו ראשון	מחקר קליני שלב 3, רב-מרכזי, אקראי, גלוי תווית, מבוקר עם טיפול השוואה פעיל, של הטיפול במסבריליזומאב (MK-3475) בשילוב עם מאציטוזומאב וביטקיקן (Sacituzumab Govitecan) לעומת טיפול חד-תרופתי עם MK-3475 כטיפול קו ראשון במשתתפים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים גרורתי שאישור תאי הניהול המבוטאים PD-L1 (Tumor Proportion Score, TPS), היו 50% או יותר (KEYNOTE-D46/EVOKE-03)	MK3475-D46	• בשילוב עם מאציטוזומאב וביטקיקן לכין מסבריליזומאב בלבד מבחינת (pembrolizumab) להשוות בין מסבריליזומאב ההישרדות ללא התקדמות של המחלה. • להשוות בין מסבריליזומאב בשילוב עם מאציטוזומאב וביטקיקן לכין מסבריליזומאב בלבד מבחינת ההישרדות הכוללת •	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05609967?term=MK3475-D46&draw=2&rank=1#https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05609967?term=MK3475-D46&draw=2&rank=1	Lungs
0562-21	ד"ר סין שמאי	ריאה Lung	קו ראשון	מחקר שלב 3 (שלב מכריע) של NBTXR3 המפעלת על ידי רדיותרפיה בלבד או רדיותרפיה בשילוב עם צטוקסמאב לפי בחירת החוקר במטופלים קשישים עם קרצינומה מתקדמת מקומית של תאי קשקש בראש ובצוואר שאינם מתאימים לקבלת כימותרפיה מבוסס פלטינום.	NANORAY-312	להעריך את תוצאות הישרדות בנבדקים שטופלו ב-NBTXR3 בהתרקה תוך-גידולית, המופעלת על ידי רדיותרפיה בלבד או רדיותרפיה בשילוב עם צטוקסמאב לפי בחירת החוקר, בהשוואה לבחירת החוקר בלבד, להן) יקראו NBTXR3/RTצטוקסמאב לעומת RTצטוקסמאב	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04492173?term=NANORAY-312&rank=1#locations	Lungs
0137-22	פרופ' מרימסקי	ריאה Lung	קו שני	מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה לא סבוכלטיביב בשילוב עם אוסימרטיניב לעומת כימותרפיה כמולה מבוסס פלטינום בנשאים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים, מתקדם מקומית או גרורתי, עם ביטוי יתר (שאם ביטוי מוגבר של מוטציית EGFR, MET, שמחלתם התקדמה במהלך טיפול עם אוסימרטיניב. במהלך טיפול עם אוסימרטיניב (SAFFRON)	D5087C00001	לקבוע את היעילות של סבוכלטיביב בשילוב עם אוסימרטיניב לעומת כימותרפיה כמולה מבוסס פלטינום בנשאים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים, מתקדם מקומית או גרורתי, עם ביטוי יתר (שאם ביטוי מוגבר של מוטציית EGFR, MET, שמחלתם התקדמה במהלך טיפול עם אוסימרטיניב.	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05261399?term=D5087C00001&draw=2&rank=1	Lungs

0809-21	ד"ר סיון שמאי	ריאה Lung	קו ראשון	מחקר שלב 3 גלוי תווית של טיפול ב MK-7684A (פרמולוביה משולבת של רבטסולימאב עם פמברולימאב) בשילב עם כימותרפיה ואחרי MK-7684A לעומת טיפול בכימוותרפיה ואחרי דורבאלימאב, במשתתפים עם NSCLC מתקדם מקומית, בשלב III, שאינו מתאים להסרה בניתוח (KEYVIBE-006) (MK7684A-006)	MK7684A-006	להשוות את הטיפול ב-MK-7684A בשילב עם כימותרפיה לטיפול בפמברוליזומאב בשילב עם כימותרפיה מבחינת הישרדות הכוללת (OS)	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05298423?term=MK7684A-006&draw=1&rank=1	NSCLC	Lungs
0379-22	ד"ר סיון שמאי	ריאה Lung	מחקר נתונים	מחקר לרישום נתוני מחלה על מטופלים עם סרטן ראות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) בשלב מתקדם עם שינויים גנטיים הגורמים לירלוא ב METex14.	MS200095-0050	מטרתו של המחקר הרב לאומי לרישום נתוני המחלה היא איסוף פרוספקטיבי (עם מעקב ארוכ) של נתונים איכותיים מהמקורם בזמן אמת על מגוון לאחר שינויים בתחום הטיפולים ב-NSCLC בהשוואה לאורך זמן. המחקר לרישום נתוני המחלה יאסוף נתונים על מאפיינים הבדקים ומאפיינים קלינים (לדוגמה נתונים על סמנים ביולוגיים). דיווחי טיפול ותוצאות היעילות והבטיחות של מטופלים עם NSCLC בשלב מתקדם עם METex14. המטופלים בטיפול מערכתי.	https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=MS200095-0050&cntry=&state=&city=&dist=	NSCLC	Lungs
0520-22	ד"ר סיון שמאי	ריאה Lung	קו 1	מחקר פלטפורמה שלב 2 להערכת הבטיחות והיעילות של שילוב טיפולים חדשניים במטופלים עם סרטן ראות	GS-US-624-6376	מטרתו של מחקר זה היא לבדוק אם שילובים שונים של תרופות ניסיוניות בשם זימבריליומאב [zimberelimab], דומבנילומאב [domanalimab], סיקיטומאב גאיניקאן [sacitizumab govitecan], אטרומדנוסט [etrumadenant] בטוחים ויעילים בהשוואה לתרופות סטנדרטיות שכבר זמינות בשוק בחור טיפולים עבור NSCLC.	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05833667?term=GS-US-624-6376&draw=2&rank=1	NSCLC	Lungs
0615-23	ד"ר שמאי	ריאה Lung	קו ראשון	מחקר שלב 2/3, כפל-סמיות, בהקצאה אקראית של פאלוזמאב (נוגוז) נגד LAG-3 בשילב עם סמיפלימאב (נפנז) נגד PD-1 לעומת טיפול יחידני בסמיפלימאב לטיפול קו ראשון במטופלים עם סרטן ראות מתקדם מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) עם לפחות 50% מהמקלים המבטאים PD-L1.	R3767-ONC-2235	מטרת עיקרית לטוב 2: להעריך את שיעור התגובה האובייקטיבי (ORR) על פי רמות ביקורת מרכזית מלחי תחילת מנת (BICR) של הטיולב של סמיפלימאב (cemiplimab) וזיזוזלומאב (fianlimab) לבין מרכזן של 1,600 לבין מרכזן של 400 מ"ג בהשוואה לטיפול יחידני בסמיפלימאב לטיפול קו ראשון במטופלים עם NSCLC מתקדם מקומית שלחם בנוסאים PD-L1 חיוביים 50% מאוי תחילה. מטרת עיקרית לטוב 3: לחקות את מהרכיבות המחלה של הטיולב של סמיפלימאב ואבאלימאב לעומת טיפול יחידני בסמיפלימאב.	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05785767?term=R3767-ONC-2235&rank=1#locations	NSCLC	Lungs
0549-23	פרופ מרמסקי	ריאה Lung	קו ראשון	ניסוי שלב 3 פתוח, אקראי, מבוקר פעיל, רב-מרכזי להערכת היעילות והבטיחות של דיפלוטיניב (Zipalertinib) בהשוואה כימותרפיה לעומת כימותרפיה בלבד במטופלים עם סרטן ראות מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) לא-קשקשי מתקדם מקומית או גרורתי, שלא טופל בעבר, עם מוטציות הזדרות אקסון 20 (exon20ins) בקולטן לקוגמי גדילה אפידרמי (EGFR).	TAS6417-301	חלק א' הרצה בטיחות – לקבע את תהיון המומלץ של דיפלוטיניב בשילוב עם פמטינוסטאט (pemetrexed) וחומר בטוסה-פלטינום, שיכוון בטוך 3 על המחקר	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05973773?term=TAS6417-301&rank=1#locations	NSCLC	LUNG
0178-24	ד"ר ארי רפאל	ריאה Lung	קו ראשון	ניסוי שלב 3 פתוח, אקראי, מבוקר פעיל, רב-מרכזי להערכת היעילות והבטיחות של BAY 2927088 הנתינת דרך הפה בהשוואה לטיפול המקובל, טיפול קו ראשון בחולים עם סרטן ראות מסוג תאים שאינם קטנים (NSCLC) המקדם מקומי או גרורתי עם מוטציות מפעילות- HER2.	22615	מטרת עיקרית: הערכת התגובה של BAY 2927088 בהשוואה לטיפול המקובל (SoC) בהישרדות ללא התקדמות המחלה. הערכת היעילות של BAY 2927088 מטרת משנית: הערכת היעילות של BAY 2927088 בהשוואה ל-SoC בהיבטי תגובה אובייקטיבי (ORR), הערכת התגובה של BAY 2927088 בהשוואה ל-SoC בהישרדות ללא התקדמות המחלה, אפיון נוסף של הישרדות של BAY 2927088 בהשוואה לטיפול המקובל, הערכת הבטיחות והבטיחות של BAY 2927088 בהשוואה לטיפול המקובל, הערכת תוצאות בדיווח מטופל של BAY 2927088 בהשוואה לטיפול המקובל	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06452277?term=22615&rank=1#locations	NSCLC	LUNG
0111-23	פרופ מרמסקי	ריאה Lung	קו שני	מחקר שלב III רב-מרכזי, גלוי תווית, בהקצאה אקראית של לרבינקנדין כדכשיר יחיד או לרבינקנדין בשילב עם אירינוטקאן לעומת בחירת החקר (טופוטקאן או אירינוטקאן) במטופלים עם סרטן ראות נשוי מסוג תאים קטנים (SCLC) (ניסוי LAGOON)	PM1183-C-008-21	חלק ב' טלב 2 – לקבוע את ההישרדות ללא התקדמות (PFS) בין זרועות הטיפול	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05153239?term=PM1183-C-008-21&rank=1#locations	NSCLC	LUNG
0249-21	ד"ר שמאי	Desmoid Tumors-Sarcoma	קו 1 וגם אחרי טיפולים	מחקר שלב 2/3, אקראי, רב מרכזי להערכת RINGSIDE- AL102 במטופלים עם גידולי דסמואיד מתקדמים	AL-DES-01	חלק א המטרה העיקרית של חלק זה של המחקר היא להעריך את הבטיחות והסבילות של AL102 בבדקים עם גידולי דסמואיד מתקדמים. חלק ב המטרה העיקרית של חלק זה של המחקר היא להעריך את האפקטיביות של AL102 על ההקדמות המחלה בבדקים עם גידולי דסמואיד מתקדמים.	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04871282?term=AL-DES-01&draw=2&rank=1	Soft Tissue	Sarcoma
0090-23	פרופ זוננבלק	שד Breast	קו 1	מחקר פאזה II, רב-מרכזי, אקראי, בפסיות כפולה של RO7247669 בשילב עם נאב-פקליטקסל, בהשוואה לפמברוליזומאב בשילב עם נאב-פקליטקסל, בנשותמתים עם סרטן שד שליל לשלשת הקולטנים וחיבי PD-L1, מתקדם מקומית שאינו נתיח או גרורתי, שלא קיבלו טיפול קודם למחלתם הגרורתית.	CO44194	מטרה עיקרית: להעריך את היעילות של RO7247669 עם נאב-פקליטקסל לעומת פמברוליזומאב עם נאב-פקליטקסל בשילב ב-FAS. מטרות משניות: להעריך את היעילות של RO7247669 עם נאב-פקליטקסל לעומת פמברוליזומאב עם נאב-פקליטקסל ב-FAS. להעריך את היעילות של RO7247669 עם נאב-פקליטקסל בהשוואה לפמברוליזומאב עם נאב-פקליטקסל בפדרות ניתוח החיבית ב-SP142 ו- SP263, 22C3. להעריך את הבטיחות של RO7247669 עם נאב-פקליטקסל לעומת פמברוליזומאב עם נאב-פקליטקסל ב-SAS. לאפיין את פרופיל ה-PK של RO7247669. להעריך את האימונוגנות ל-RO7247669	https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05852691?term=CO44194&draw=1&rank=1&2	Breast	Breast
0572-22	פרופ זוננבלק	שד Breast	Adjuvant	מחקר EMBER-4. מחקר שלב 3 אקראי, גלוי תווית על טיפול אדלבנטוב בשילוב עם אנדוקרינוטרפיה (imbrenestant) לעומת טיפול הורמונלי אדלבנטוב בשילב עם נאב-פקליטקסל, בנשותמתים עם סרטן שד שליל לשלשת הקולטנים וחיבי PD-L1, מתקדם מקומית שאינו נתיח או גרורתי, שלא קיבלו טיפול קודם למחלתם הגרורתית.	J2J-MC-JZLH	להעריך את יעילות איתמוקסטרנט (ראיא א) לעומת טיפול ב-SOC האדג'בנוב ב-ET (ראיא ב') במטופלים שקיבלו טיפול ET מקובל במשך שנתיים עד חמש שנים ב-HER2- ,HER+, עם סרטן חוצבר לרשמות.	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05514054?term=J2J-MC-JZLH&draw=2&rank=1	Breast	Breast
0953-20	פרופ זוננבלק	שד Breast	קו 2/3	מחקר מסריה שלב 2/3 גלוי-תווית, רב מרכזי, אקראי, להערכת היעילות הבטיחות של שילוב טיפולים חדרים במטופלים עם סרטן השד (MORPHEUS-BREAST CANCER)	CO42867	להעריך את היעילות והבטיחות של שילוב טיפולים בהמלך של 1 שלב 2.	https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04027597?term=CO42867&draw=2&rank=1	Breast	Breast
0089-21	פרופ זוננבלק	שד Breast	איסוף מידע	נתוני MammaPrint, נתוני BluePrint ונתוני הבנוים השלם מקושרים לתמנים קליניים להערכת פרופילים חדשים של ביטוי גנים: רישום המאפשר האצמה (מחקר FLEX)	FLEXRegistry	יצירת רישום מבוסס אונלוייה, בקנה מידה גדול, של נתוני ביטוי של הגנום השלם ושל נתונים קליניים להיקרת קשרים חדשים מבוסס גנים בעלי ערך פרוגנוסטי ולא ערך ב	https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=FLEXRegistry&cntry=&state=&city=&dist=	Breast	Breast
0186-23	פרופ זוננבלק	שד Breast	קו שני /שלישי	מחקר רב-מרכזי, בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית להשוואת היעילות והבטיחות של לוזוטוקסיבן בשילב עם אמפרליב לעומת פולוסטרנט בשילב עם אבמציקליב לטיפול בגברים בנשים לפי הידלון הוסת לאחר הידלון הוסת עם סרטן שד מתקדם מקומית או גרורתי, חיבי ל-ER שליל ל-HER2, עם מוטציה ב-ESR1.	SM22-002(ELAINI3)	content max_field_size להעריך את היישרדות ללא התקדמות של המחלה (PFS) עם הטיפול המשולב בלוזוטוקסיבן ובאבמציקליב בהשוואה לטיפול המשולב בפולוסטראנט ובאבמציקליב, בגברים ובנשים לפני הידלון הוסת, שקבלו בעבר טיפול המבוסס על רביוציקליב או פלבציקליב, ישו להם סרטן שד מתקדם מקומית או גרורתי חיבי לקולטן אסטרוגן (ER)שליל- ל-(HER2) epidermal growth factor 2 32000 estrogen receptor 1 (ESR1) ."מוטציה בגן	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05698626?term=BMX%2022-002&rank=1	Breast	Breast
0448-23	פרופ זוננבלק	שד Breast	קו ראשון	ניסוי פאזה III, אקראי, בתווית-פתוחה להערכת היעילות והבטיחות של פרידרסטראנט (CDK4/6i) בהשוואה לפולוסטרנט (CDK4/6i), במטופלים עם סרטן שד מתקדם חיבי לקולטן לאסטרוגן ושליל ל- HER2, עמיד לטיפול אנדוקרי אדג'בנוב קודם	CO44657	הערכת היעילות (PFS) של גידרסטראנט לעומת פולוסטרנט (כאשר שניהם ניתנים בשילב עם CDK4/6i) בחת-הקבוצה של ESR1m ו- FAS • הערכת היעילות (PFS) של גידרסטראנט לעומת פולוסטרנט (כאשר שניהם ניתנים בשילב עם CDK4/6i) בחת-הקבוצה של ESR1mmd • הערכת היעילות (OS) של גידרסטראנט לעומת פולוסטרנט (כאשר שניהם ניתנים בשילב עם CDK4/6i) בחת-הקבוצות של ESR1mmd ו- ESR1m ו-FAS mmd – no mutation detected* FAS* – Full analysis set	https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=0295-21-TLV&cntry=&state=&city=&dist=https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=0295-21-TLV&cntry=&state=&city=&dist=	Breast	Breast
0295-21	ד"ר שלומית סטרולוב	שד Breast	איסוף מידע	דיווי שיטים מולקולריים המבאים תגובה לטיפולים במטופלות עם סרטן שד	0295-21-TLV	מטרת המחקר היוה לאתר שינויים מולקולריים בנקבות טיפול סיסטמי לסרטן שד.	https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=&term=0295-21-TLV&cntry=&state=&city=&dist=	Breast	Breast
0147-23	פרופ' ספרא	Ovarian Primary Peritoneal, or Fallopian Tube Cancer	קו שני או שלישי	מחקר שלב 3 של רלקוריאנט בשילב עם נאב-פקליטקסל לעומת נאב-פקליטקסל טיפול יחידני בסרטן שחלות אפיתליאלי, בסרטן ראשוני של הצפק או סרטן חוצרתם מקדמם בדרגה גבוהה העמיד לפלטינום (ROSELLA)	CORT125134-556	להעריך את היישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS) לפי סקירה מרכזית בלחי תלויה בלחי תמיה סמיות (BICR) במטופלות שטופלו במשטר לפיוגבו של רלקוריאנט בשילב עם נאב-פקליטקסל (nab paclitaxel) בהשוואה למטופלות שטופלו בטיפול יחידני של נאב-פקליטקסל.	https://classic.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05257408?term=CORT125134-556&draw=2&rank=1	Gynecology	Gynecology
0133-23	פרופ' ספרא	Ovarian CANCER	MAINTENANCE	מחקר שלב 2/3 בתווית גלויה להערכת: REFRaME-O1: (Luveltamab Tazevibulin) היעילות והבטיחות שלב של לבלטאמאב טזוויבולין לעומת טיפול כימותרפיה אבבנד (STRO-002) בנשים עם הישנות של סרטן שחלות (IC) על יד המוקר אפיתליאלי עמיד לפלטינום (כולל סרטן החצוצרות או נוני סרטן פריטוניאלי) (FOLR1 Folate Receptor Alpha)) ראשוני של הצפק) המבטא את עמיד-לפלטינום המבטא את FOLR1	STRO-002-GM3	להעריך את היעילות של לבלטאמאב טזוויבולין בבדקות עם הישנות של סרטן שחלות אפיתליאלי עמיד לפלטינום המבטא את FOLR1. להעריך מדדי תוצאות נוספים של היעילות של לבלטאמאב טזוויבולין בבדקות עם הישנות של סרטן שחלות אפיתליאלי עמיד לפלטינום המבטא את FOLR1 להעריך את הבטיחות והסבילות של לבלטאמאב טזוויבולין בבדקות עם הישנות של סרטן שחלות אפיתליאלי עמיד-לפלטינום המבטא את FOLR1	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05870748?term=STRO-002-GM3&rank=1#locations	Gynecology	Gynecology
0134-23	פרופ' ספרא	Ovarian Primary Peritoneal, or Fallopian Tube Cancer	טיפול משמר PLATIUM SENSIVE	מחקר שלב 3 בהקצאה אקראית, רב-מרכזי, בתווית פתוחה, על מירבזוקוסימאב מרבטנסין בשילב עם בוואיזומאב (bevacizumab) לעומת בוואיזומאב בלבד כטיפול תחזוקה, עבור מטופלות עם סרטן שחלה אפיתליאלי, סרטן חוצרתם או סרטן ראשוני של הצפק, בעלי ביטוי FRα גבוה, נשים ורגישים לפלטינום, שמחלתן לא התקדמה לאחר טיפול קו-שני בכימותרפיה בנוסאמ-פלטינום יחד עם בוואיזומאב.	IMGN853-0421	מטרה משנית ברמה: • להשוות את היישרדות המחלה (OS) בין מטופלות שקבלו בשבוע לקבלת טיפול מחזקי ב-MIRV בהשוות בפרוטוקול (ראיון 1) לעמדת בפרוטוקול (ראיון 2) מטרות משניות ברמה: • מטרות משניות נוספות הנאים אבן מטופלות ללא מחלה מקדמת (PD) לאחר כימותרפיה בנוסאמ-פלטינום בהשוות בפרוטוקול, שקבע בשקיבל לטיפול המחזקה ב-MIRV בהשוות בפרוטוקול לעמדת בפרוטוקול (ראיון 2) בהשוות בפרוטוקול • בדיקת מי לתקדמות מחלה בנוסאמ-פלטינום (PFS2) • שיעור תגובה אובייקטיבית (ORR), שי שיעור על יד המוקר ועל יד מקרה מרכזית בלחי מחלה (BICR), אבל מטופלות שיש לקן מחלה לפרוטוקול לפי RECIST v1.1 • משך התגובה (DOR), נמי שיעור על יד המוקר ועל יד מקרה מרכזית בנוסאמ בלחי מחלה • (BICR), אבל מטופלות שיש תגובה מלילה מאוריות ומבוי מאבר של תגובה מלאה (CR) או אבל מלילה מאוריות ומבוי מאבר של תגובה חלקית, שמחלתן לא התקדמה לאחר טיפול קו-שני בכימותרפיה בנוסאמ-פלטינום (נוסאי מטופלא) • הישרדות ללא מחלה (DFS), נמי שיעור על יד המוקר ועל יד מקרה מרכזית בנוסאמ בלחי מחלה (BICR), אבל מטופלות שיש לקן מחלה המקדמת לפרוטוקול	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05445778?term=IMGN853-0421&rank=1#locations	Gynecology	Gynecology
0490-23	פרופ' ספרא	סרטן רירית הרחם	לאחר 3 קווי טיפול	מחקר שלב 3 רב מרכזי, אקראי, זרוע ביקורת פעילה, גלוי תווית, להשוואת היעילות והבטיחות של טיפול יחידני ב- MK-2870 לעומת טיפול לבחירת החוקר, בנשותמתים עם סרטן רירית הרחם שקיבלו טיפול קודם בכימותרפיה המבוסס על פלטינום ובאימונותרפיה (ENGOT-en23/GOG3095) (MK2870-005)	MK-2870-005	מבחינת הישרדות ללא התקדמות המחלה (TPC) לטיפול לבחירת הרופא MK-2870 להשוות את • על פי סקירה (RECIST 1.1) בהתאם לגרסה 1.1 של הקריטריונים להערכת התגובה בגידולים מוצקים (BICR) מרכזית בלחי תלויה ללא הטרה של הטפטות (OS) מבחינת הישרדות הכוללת TPC- ל MK-2870 להשוות את •	https://clinicaltrials.gov/study/NCT06132958?term=MK-2870-005&rank=1#locations	Gynecology	Gynecology
0358-23	ד"ר מור מיזובניק	melanoma	קו ראשון	מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה של נבולומאב בשילב עם ולאטינאיב במרוון קבוע בתון תת-עור לעומת נבולומאב בשילב עם ולאטינאיב במרוון קבוע בתון תוך-ורידי במשתתפים עם מלנומה גרורתית שלא טופלה בעבר אם שאינה נתונה לכריתה	CA224127	מטרתו של מחקר זה היא להוכיח את היעדר הנחיתות הפרמקוקינטית עבור FDC של ניבולומאב בהנסת ולאטינאיב בתון תת-עור בהשוואה ל-FDC של נבולומאב בהנסת ולאטינאיב בתון תוך-ורידי עבור Cavg24 (ריכוז בסרום המצוע לאיך זמן לשיוך 28 שיום) (Cmins (ריכוז שיכל בסרום בסוב יום) בקרב משתתפים עם מלנומה גרורתית או שאינה ניתנת לכריתה שלא טופלה בעבר.	https://clinicaltrials.gov/study/NCT05625292?term=CA224127&rank=1#locations	skin	
0426-23	פרופ רזית גבע	איסוף דגימות מימת		איסוף דגימות ביולוגיות של נזלי מימת מטאירה מחולים אונקולוגים ללא התערבות נוספת מעבר לטיפול השגרה, לצרך הערכה חוקרת אופית של התכנות של מכשיר אלוטרה-פיסרגרה עפקי משולל.	0426-23-TLV	הערכת המכשיר של חברת פרגיים ואת עמידותם בעת ניקוז נזל מימת סרטנית, ומכך להטיק האם מכשיר זה יכול לשמש בעתיד כטיפול בחולים אונקולוגים		דגימות ביולוגיות של נזלי גוף	
0944-20	פרופ עידו גולף		איסוף נתונים מחולים שעברו NGC	מתוקף איסוף נתונים לגבי המאפיינים והתוצאות מחולים עם גידולים סרטניים מוצקים שעברו בדיקת פרופיל גנומי בשיטת ריצוף מהדור החדש (NGS).	MX39897	לספק פלטפורמה לתמיכה בתכנון ובביצוע של מחקר קליני ואפידמיולוגי • לפתח פלטפורמה מבוססת עדיות על מנת להבין באופן טוב יותר תהליכי טיפול בסרטן • NGS לאפיין את הטיפולים והמחלל הקליני של גידולים סרטניים מוליים בחולים שעברו בדיקות •	https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT04529127?term=MX39897&rank=1	NGS	