



# كراسة ارشاد قسم سرطان الدم وزرع النخاع الشويكي للأطفال



مستشفى دانا دويك  
للأطفال



المركز الطبي تل أبيب  
على اسم سوراسكي  
علاج مهني ومنتيمر ، معاملة إنسانية عالية



مؤسسة مريم  
Mariam Foundation  
קרן מרים

# الأهالي الأعزاء،

التعامل مع مرض السرطان لدى طفلكم هي عملية مركبة وتؤثر على حياة العائلة بأكملها. هذه الكراسة اعدت خصيصًا لأجلكم، كي تساعدكم على التعرف على اهم المعلومات المتعلقة بالمرض في هذه الفترة. سوف تساعدكم هذه الكراسة في التعرف على مرحلة تشخيص المرض، تفسير نتائج الفحوصات، منع التلوث، اعراض جانبية وكيفية التخفيف منها، التعرف على التغذية السليمة في هذه المرحلة وما بعدها، والتعرف على عوارض التي يجب الاهتمام بها إذا ظهرت خلال فترة العلاجات. بالإضافة الى ذلك، تحتوي هذه الكراسة على معلومات قد تساعدكم في دعم الطفل والعائلة عاطفيًا، وطرق تعامل وتفاعل سليمة للعائلة مع الطفل في فترة المرض. نأمل بأن تجدوا منفعةً من هذه الكراسة وتتمنى لكم ولأطفالكم الصحة والعافية.

يدًا بيد معكم طول الطريق،

**بنينة جرينبيرج**  
ممرضة الاستشفاء اليومي

**مرسيلا برويتمان**  
ممرضة مسؤولة

**د. رونيت الحاسيد**  
مديرة القسم

وكل طاقم القسم.



סירקו את הקוד  
למגילת זכויות הילד



סירקו את הקוד  
למידע נוסף על המחלקה



# كيف نفهم فحوصات الدم؟

فحوصات الدم هي جزء ضروري من عملية تشخيص المرض وعملية تتبع حالة المريض بعد العلاج الكيماوي. أحد الأعراض الجانبية لهذا العلاج هو إنخفاض في عدد كريات الدم المختلفة.


## تعداد الكريات الدموية يشمل 3 مجموعات من الكريات:

### الكرات الحمراء



هذه الكريات تحتوي على الهيموغلوبين، وتستطيع بواسطته أن تنقل الأوكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم المختلفة. هذه الخلايا تعطي الدم لونه الأحمر. المستوى الطبيعي للهيموغلوبين في فحص الدم هو بين 12% - 16% جرامًا، ويشار إليه في ورقة نتائج الفحص ب-HB. مستوى الهيموغلوبين المنخفض يدل على فقر الدم (ANEMIA)، حيث قد يشعر الطفل بالتعب، ضعف، ضيق النفس، نبضات القلب السريعة، دوار وقد يبدو شاحبًا. تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب الوضع العام للطفل، وبحسب مستوى الهيموغلوبين (حول 8% غرام)، قد يتقرر إعطاء وجبة دم.

### الكرات البيضاء (ليوكوايטים - WBC)



هذه الكريات تشكل جزءًا من جهاز المناعة الذي يحمي الجسم من أي عامل غريب قد يصيبه، وبشكل أساسي يحميه من الملوثات (كالفيروسات والجراثيم). المستويات الطبيعية لهذه الكريات هي بين 4,500 - 11,000، وتكون هذه المستويات أعلى في الأطفال. هناك ثلاثة أنواع رئيسية للكرات البيضاء: نيوتروفيليم، ليومفوايטים ومونوايטים. سنتركز باثنتين منها:

**نيوتروفيليم** - وهي أول ما يحمي الجسم من الجراثيم والفطريات. المستوى الطبيعي: 1,500 - 8,400، وهو عدد مطلق وليس النسبة (ANC - Absolute Neutrophil Count).  
نوتروفونيا (نيوتروفونيا): هي حالة نقص هذا النوع من الكريات البيضاء حيث يكون تعدادها أقل من 1,500 كرية. انخفاض التعداد إلى ما دون الـ 500 يشكل خطرًا على الحياة ويرتفع احتمال حدوث تلوث. تجدر الإشارة إلى أنه وإن تزامن هذا الانخفاض مع ارتفاع درجة الحرارة، سيكون الأمر مستوجبًا للعلاج في المستشفى وباستخدام المضادات الحيوية (انتيبيوتيكية) الواسعة التغطية.  
**ليومفوايטים**: تنتج الجسيمات المضادة وتساهم في ردة فعل جهاز المناعة.


## الصفائح الدموية (Platelets/PLT)

وظيفة هذه الجسيمات هي السيطرة على النزيف ومنعه، حيث أنها تشارك في عملية تخثر الدم. مستواها الطبيعي يكون 150,000 - 450,000.

إذا انخفض عدد الصفائح سيرتفع احتمال حدوث نزيف. بانخفاض عددها إلى ما دون الـ 50,000 ممكن أن تظهر الأعراض التالية:

- نزيف من الأنف و/أو اللثة.
- نقاط حمراء صغيرة على الجلد.
- علامات زرقاء على الجلد.

كما أشرنا، انخفاض مستوى الصفائح قد يؤدي إلى حدوث نزيف تلقائي. لذلك من المتوجب الامتناع عن أية فعالية التي من شأنها أن تُعرضك للجرح. في حال حدوث جرح يجب التوجه للطبيب.



## منع التلوث:

جهاز المناعة يحمي الجسم من التلوث. بعد العلاج الكيماوي، يصاب جهاز المناعة بضعف بأغلب الأحيان ويحدث انخفاض في تعداد الدم (פספס 56)، بحيث ان الجسم يصبح اكثر عرضة للتلوث والمرض. لهذا، من الضروري الحفاظ على نظافة الجسم في هذه الفترة، الانتباه الى نظافة الاكل ومصدره، والانتباه الى البيئة المحيطة ونظافتها كما سيفسر لاحقًا.

### النظافة الشخصية:

- استحمام بشكل يومي
- غسل اليدين بشكل صحيح - يجب غسل الايدي قبل وبعد الحالات التالية: استعمال المراض، تنظيف افرازات الجسم، تحضير الطعام، التعامل مع الحيوانات وتغيير ضمادة أنبوب القسطرة المركزية.
- نظافة الفم: من الاعراض الجانبية للعلاج الكيماوي هي إصابة الخلايا التي تغطي جهاز الهضم. تظهر هذه الاعراض ايضًا في منطقة الفم، بما انه جزء من جهاز الهضم وتسمى ستوماتيتس (פספס 56). يمكن ان تظهر هذه الاعراض ابتداء من 12-24 ساعة بعد العلاج الكيماوي وحتى أسبوع او 10 أيام من بعد العلاج. يمكن التخفيف من حدة هذه الاعراض عن طريق الحفاظ على نظافة الفم خلال فترة العلاج الكيماوي وما بعده.
- لذلك، يجب فرك الاسنان بفرشاة اسنان ناعمة بعد كل وجبة طعام وقبل النوم. في حالة ظهور نزيف دموي في اللثة، يجب التوقف عن استعمال فرشاة الاسنان والاكتفاء بغسل الفم فقط واعلام الطبيب المعالج.
- غسيل الفم هو بديل عن فرك الاسنان في مرحلة הפספס 56. غسل الفم يتم بمحلول ملحي (Saline 0.9%) او محلول مائي مع بيكربونات الصودا.



## البيئة المجاورة:

- بعد التسريح من المستشفى، من المفضل تقليل المكوث في الأماكن العامة المغلقة مثل المجمعات التجارية، الباصات، المصاعد وبقرى مرضى آخرين.
- الحرص على عدد زائرٍ قليل في كل زيارة للمريض.
- الحرص على تهوية البيت بعد كل زيارة منغًا للتلوث.
- يتوجب الامتناع عن التواجد في مواقع بناء وأماكن التي يكثر بها الغبار، اذ انه من الممكن ان يحمل الغبار فطريات التي تؤدي الى التلوث.
- من المفضل عدم المكوث تحت الشمس في فترة العلاجات الكيماوية، اذ ان حساسية الجلد تزداد في هذه الفترة وإمكانية ظهور بقع جلدية. من الممكن التجول في الهواء الطلق بشرط لبس ملابس طويلة واعتماد قبعة.
- الامتناع عن وضع الزهور او النباتات بمقربة من المريض لوجود جراثيم في النباتات.

## حيوانات اليفة:

- ان كان بحوزتكم حيوان اليف مثل قط او كلب، بإمكانكم ابقائه في البيت شرط الامتناع المريض عن ملامسته بشكل قريب، وشرط ان تنظيف بيئة الحيوان والتعامل مع افرازاته تتم على يد شخص اخر.
- يتوجب تطعيم الحيوان بشكل دوري، الحرص على إبادة الديدان الطفيلية في الحيوان ومتابعة وضعه الصحي على يد طبيب بيطري.
- الحرص على غسل الايدي بعد التعامل مع الحيوان الاليف.



## تطعيمات الطفل:

- يمنع تطعيم الطفل بدون اعلام واستشارة أطباء القسم.
- يتوجب استشارة أطباء القسم في امر تطعيم أبناء العائلة بالتطعيمات الروتينية. في حالة ظهور اعراض مرض بعد التطعيم يجب اعلام الطبيب المعالج فورًا.
- في حالة تعرض الطفل لفيروس الفيريتسيلا - فيروس يسبب مرض جذري الماء (אבולועות רוח)، او إصابة أحد أبناء العائلة بمرض جذري الماء، يجب اعلام الطبيب المعالج فورًا.

# القسطار الوريدي المركزي

## القسطار من نوع بيك-لاين (فيك711) والقسطار من نوع هيكمان (هيكمان)

هي أنابيب التي تمر عبر الجلد وتصل إلى وريد مركزي. يجب الامتناع من الدخول مع هذه الأنابيب إلى الماء (في الاستحمام، البحر أو البركة). قبل الاستحمام يجب تغطية الأنبوب بالنايلون اللاصق (نيلون لاصق)، وبعد الانتهاء من الاستحمام يجب فحص الضمادة دائمًا. إذا لوحظت الرطوبة على الضمادة، يجدر تبديلها فورًا. يجب تبديل الضمادة البيضاء مرة باليوم، وأما الضمادة الشفافة فيجب تبديلها مرة بالأسبوع.

## قسطار من نوع بورت-أ-كاث (بورت-أ-كاث)

هو عبارة عن علبة صغيرة يتم وضعها تحت الجلد ويتصل بها أنبوب الذي يصل إلى وريد مركزي. يتم وخز هذه العلبة الصغيرة بواسطة إبرة تسمى جريير (جرير). من المهم أن نشير بأنه يمكن تخدير مكان الوخز بواسطة مرهم يدعى إيملا (Emla) أو بواسطة بخاخ مخدر. تغيير الضمادة والأنبوب الذي يتصل من الخارج بالعلبة في أثناء تلقي العلاجات هي من مهمات الطاقم الطبي، وذلك كما هو الحال مع سائر أنابيب القسطرة. بعد إخراج إبرة الـ "جريير" يمكن الاستحمام بشكل طبيعي وذلك دون الحاجة لتضميد المكان. في حال تسريحكم من المستشفى مع هذه الإبرة، فعندها يجب لف المنطقة قبل الاستحمام بواسطة النايلون اللاصق، وبعد الاستحمام يجب فحص سلامة الضمادة. إذا لوحظت الرطوبة على الضمادة يجب تبديلها فورًا.

- قبل كل ذهاب للمستشفى من المفضل وضع مرهم التخدير على المنطقة التي سيتم وخزها وتغطيتها بالنايلون اللاصق وذلك من أجل الوصول إلى درجة التخدير القصوى.
- يجب غسل اليدين جيدًا قبل كل تعامل مع منطقة القسطرة.
- في حال ظهور احمرار، وجع، انتفاخ، افرازات، نزيف أو في حال خروج الأنبوب، يجب اغلاق القطع واعلام الطاقم المعالج حالًا.

# اعراض ممكنة بعد العلاج الكيماوي


ارتفاع الحرارة، غثيان، تقيؤ، امساك، اسهال، مشاكل في أغشية الفم والبلعوم، والم.

## الحرارة

قد ترتفع حرارة الجسم لأسباب عدة وذلك خلال كل مراحل العلاج. أسباب ممكنة: العلاج الكيماوي، نقص في مستويات الكريات البيضاء من نوع **نيوتروفيل** (ما يسمى نويوتروپنيا - **نيوتروفونيا**) وحالات تلوث متعددة بدون نويوتروپنيا. عندما نتكلم عن ارتفاع الحرارة، نقصد قياس حرارة 38 درجة وما فوق. يجب استشارة الطاقم الطبي في كل حالة ترتفع بها الحرارة.

يمنع القيام بالفعاليات التالية بسبب خطر النزيف والتلوث:

- يمنع قياس الحرارة عن طريق فتحة الشرج.
- يمنع منعًا باتًا استخدام الأدوية نوروبين/أدليل (**نورپين/أدوييل**)
- على أنواعها (تحدث خللاً في وظيفة الصفائح)
- يمنع استخدام التحاميل لخفض الحرارة أو منع الأوجاع.



## التهاب الأغشية المخاطية (Mucositis)

هو التهاب شائع يترافق مع علاجات السرطان، ويتضمن التهابًا في غشاء الفم وقد يسبب ألمًا، احمرارًا وتقرحات.

من الممكن التقليل من احتمال حدوث هذا الالتهاب وذلك عن طريق العلاجات الفموية قبل، في أثناء وبعد تلقي العلاج. العلاج الفموي يزيد من تدفق الدم الى منطقة الفم واللسان وبذلك يساعد على تقليل احتمال حصول هذه الظاهرة.

## نصائح للعلاج:

1. يجب تنظيف الاسنان واللثة بواسطة فرشاة أسنان ناعمة (يمكن نقع الفرشاة بالماء قبل استخدامها). من المهم تنظيف الأسنان بعد كل وجبة وقبل النوم. من المفضل استخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.
2. في حالة ال **نيوتروفونيا** أو اذا كان الفم معرضًا الى النزيف، يجب عدم استخدام فرشاة اسنان.
3. يجب لف عود خشبي بضمادة ونقعها بسائل لتنظيف الفم. يمكن تحضير هذا السائل عن طريق مزج ربع ملعقة صودا الشرب في داخل ثلاثة أرباع كأس من المحلول الملحي (**١٦٥**). عندها يجب تنظيف اللسان، اللثة والاسنان (يجب تبديل الضمادات حتى يصبح اللسان وردي اللون). من المهم اجراء التنظيف الفموي بلطف لئلا يُجرح اللسان.
4. يجب الامتناع عن ما قد يحدث ضررًا لغشاء الفم، مثل: الطعام والشراب الساخين والبهارات الحارة.
5. في حال ظهور احمرار، الم، أو علامات إصابات بالفم أو الشفتين، يجب التوجه للطاقم المعالج.
6. من المفضل استخدام المستحضرات لتزيت الشفتين - مرهم يحتوي على مادة اللينولين (**١٦٧**).

عند تشخيص مرض السرطان وبدء العلاج الكيماوي، من المتوقع انخفاض استهلاك الطعام لدى المريض. من جهة أخرى، استهلاك المفرط للطعام هي ظاهرة ليست نادرة ايضاً في هذه الفترة. يمكن لعادات استهلاك الطعام ان تتغير نتيجة لعوارض العلاجات السرطانية - جزء من المأكولات قد يصبح اقل لذة وبالتالي سوف يقل استهلاكه.

## انخفاض في الوزن وقلة الشهية.

- يوصى بتناول عدة وجبات صغيرة ومتتالية خلال اليوم او ثلاث وجبات رئيسية ووجبه خفيفة من بعدها.
- مفضل تناول طعام ذو كثافة صغيرة لكنه غني بالسعرات الحرارية والبروتينات، مثل: بيض او عجة، اللحوم على أنواعها، قشدة، خلطة بذورات وعسل (717177)، زبدة، جوز على انواعه، جبنه صفراء، بيتسا وحتى رقائق البطاطا المقلية (تشيبس).
- خلال تناول الوجبة: تناول اولاً الأطعمة التي تحتوي على نسبة بروتينات عالية، مثلاً اللحوم قبل تناول الحساء، او الشطيرة قبل تناول القهوة.
- التنوع في الطعام اليومي وازافة أنواع طعام جديدة وتوابل تزيد من لذة الطعام.
- في حال ان رائحة الطعام لا تروق للطفل، يمكن تجربة تناول طعام بارد او في درجة حرارة الغرفة.
- تناول المشروبات بين الوجبات وليس خلالها. تناول المشروبات خلال تناول الطعام يساهم في الشعور في الشبع أسرع.
- يفضل تناول مشروبات التي تحتوي على نسبة سعرات حرارية عالية، مثل الحليب، مشروبات على أساس حليب، عصير فواكه ومشروبات خفيفة.
- يجب استشارة اخصائية تغذية او طبيب بالنسبة لتناول مكملات غذائية بالإضافة للوجبات اليومية.
- يمنع بشكل قاطع تناول اطعمة التي تباع بشكل مفرق مثل المكسرات.
- في حالة د171717، يجب غسل الفواكه والخضار جيداً، والمفضل تناولها بعد تقشيرها.
- يجب طبخ الطعام جيداً ( مثلًا: يمنع تناول بيضة مقلية - عين)
- يمنع تناول اطعمة تحتوي على بكتيريا 171717 - 1717



## في البيت:

- اخراج السجاد والستائر من غرفة الولد اذ انها مصدر تراكم بكتيريا
- امتناع نواجد الطفل بمقربة من مرضى اخرين
- الحرص على عدد زائرين قليل في كل زيارة للمريض
- الامتناع عن التواجد في أماكن عمومية مكتظة
- الامتناع عن تناول الطعام في الأماكن العمومية
- التعامل مع افرازات الجسم فقط بواسطة قفازات ملائمة
- التخلص من الحفاضات بأكياس قمامة منفردة
- بعد العلاج الكيماوي، يجب انزال الماء في المراض مرتين
- غسل الايدي بصورة جيدة

### خلال فترة العلاجات

- بعد التسريح من المستشفى، سوف يفسر لكم عن كيفية متابعة العلاج في البيت وطريقة تناول الادوية.
- قبل التسريح من المستشفى، احرصوا على تحضير وجلب الدواء اللازم من صندوق المرضى
- في حال ان الطفل لا يستطيع تناول الدواء، يجب ابلاغ الطبيب حالاً.
- في حال ان الطفل يتقيأ خلال اقل من نصف ساعة من تناول الدواء يجب استشارة الطبيب لكيفية تناول الدواء مرة أخرى.
- الحرص على تخزين الدواء في مكان امن ونظيف في البيت حسب تعليمات مصنع الدواء، بعيداً عن متناول يد الأطفال.



# تتعامل العائلة مع مرض السرطان لدى الطفل.

في فترة تشخيص المرض لدى الطفل، تمر العائلة بأزمة صعبة التي تؤثر على جميع أفرادها. يكثر في هذه الفترة شعور التوتر والخوف، خلافات عائلية وصعوبة في أداء المهام اليومية للعائلة. من الممكن ان تواجهوا صعوبات في اتخاذ قرارات بدوركم كأباء وامهات، مثلا كيفية تربية الطفل، وضع الحدود لسلوكه وسلوك اخوته والتعامل مع ضغوطات مختلفة في العلاقات العائلية. من المهم في هذه الفترة الصعبة استشارة طواقم الدعم النفسي ليرافقكم في المعضلات في هذه الفترة ويوفروا لكم أفضل السبل للتعامل مع أي مشكلة ويوفرون لكم الملجأ النفسي والدعم.

## الطفل

أحد أكبر معضلات تشخيص المرض هي اخبار الطفل بإصابته بمرض السرطان. من تجربتنا المهنية والتي تعتمد على الأبحاث والكتابات الطبية في هذا المجال، اخبار الطفل بمرضه، ومشاركته مراحل العلاج، انواعه واعراضه الجانبية تساعد على التعامل الإيجابي مع المرض. اذ ان الانفتاح في الكلام عن المرض مع الطفل يقلل الخوف والارباك لدى الطفل ويبعده عن أفكار سلبية بعيدة المدى. عدم مشاركة الطفل بهذه المعلومات من قبل الاهل بهدف "حماية" الطفل من الخبر قد يؤدي الى أزمة ثقة بين الطفل، الاهل والطواقم الطبية. الطفل بحاجة الى وسيط بينه وبين المرض والطواقم الطبية وبكلمات بسيطة تناسب قدرته على استيعاب ما يحصل.

مواجهة المرض هي أسلوب حياة جديد للطفل والعائلة، وقد تظهر صعوبات عديدة في هذه الفترة، مثلا، كثرة المكوث في المستشفى، علاجات صعبة وعلاجات التي تشوش روتين حياة الطفل والعائلة. من الممكن ان يواجه الطفل أفكار سلبية عن نفسه وعن جسده، وأفكار سلبية من ناحية اجتماعية وتعليمية اذ انه قد يفقد أيام دراسية كثيرة من المدرسة لمكوثه المتواصل في المستشفى.

من الجدير بالذكر بأن لكل طفل طريقة مختلفة في التعامل مع الضغط النفسي والصعوبات المختلفة. لذلك، طواقم الدعم النفسي تساعد في بناء خطة للتعامل مع الحالات النفسية للطفل والعائلة.



## العلاقة الزوجية

من تجربتنا، ان العلاقات الزوجية تتأثر في فترة تلقي العلاجات. في هذه الفترة الصعبة تكون هناك أهمية لتقاسم الوظائف بين الزوجين مما يتيح المحافظة على قدرتيهما وقواهما. بالرغم من الضغط الذي يرافق هذه الفترة، من المهم إن تبقيا التواصل مفتوحا بينكما، كما ومن المهم تفرغ الوقت للقاءات الزوجية. كما هو الحال في أزمات حياتية عدة، ستشكل العلاقة الزوجية دعامة متينة لكلا الزوجين وللعائلة كلها.

## الاخوة والاخوات

في هذه الفترة الصعبة، من الطبيعي أن يتركز المجهود العائلي بالطفل المريض، إلا أنه ومن المهم تذكر وجود الأطفال الاخرين بالعائلة. يشعر الاخوة أيضا بالقلق والارتباك إزاء اكتشاف المرض عند اخيهم. في بعض الأحيان قد تظهر مشاكل تصرف وصعوبات شعورية وتعليمية لدى الاخوة والتي لم تظهر من قبل. بالإضافة الى ذلك، قد تحدث تغييرات في العلاقات الأخوية بينهم. ننصح بمشاركة الاخوة بالمعلومات وذلك بالشكل الذي يناسب مستواهم. لا ننصح بإبقاء اسرار داخل العائلة. من المهم ترك حيز امن ومريح للأخوة كي يتسنى لهم التعبير عما يشعرون. قد يبدووا مشاعر تلائم الوضع: مخاوف، غضب وغيره. من المهم تكريس وقت شخصي وكافي للأطفال في البيت وذلك لتعزيز الحس بالأمان والشعور بالدعم العائلي. بالإضافة الى ذلك، من المهم تبليغ الطاقم التربوي للأخوة (في الروضة أو المدرسة) عن أمر المرض في العائلة وعن طرق التعامل العائلي معه.



# متى تتوجه الى الطبيب؟

ان المرضى الذين يتلقون علاجًا كيميائيًا معرضون للإصابة بتلوثات خطيرة وذلك بسبب اضعاف جهاز المناعة. لذلك عليكم الانتباه للأعراض التي قد تدل على حدوث تلوث.

## يجب التوجه حالاً الى الطبيب في حال ظهور أعراض جديدة مثل:

1. ارتفاع درجة الحرارة الى أكثر من 38 أو انخفاضها الى ما دون ال 36 درجة.
2. نزيف
3. حرارة
4. تقبؤ وإسهال
5. ظهور بقع على الجلد، أو علامات زرقاء
6. قلة التبول
7. ألم جديد
8. وهن أو تعب شديد
9. أي تغيير اخر في حالة الطفل.


## ساعات عمل العيادة:

يمكن تحديد موعد: في الأيام الأحد حتى الخميس بين الساعات 08:00 - 15:00,

بالهاتف رقم: 03-6974270.

في الحالات الطارئة، يمكن الاتصال بالقسم بالهاتف رقم: 03-6974296.

إذا تم اعلامكم بالتوجه الى غرفة الطوارئ، فعليكم فعل ذلك في أقرب وقت ممكن.



# تلخيص

يعمل في القسم طاقم نفسي-اجتماعي والذي من مهمته إعطاء الاهل والأطفال الدعم اللازم والذي يتلاءم مع صعوباتكم العاطفية التي تطرأ في فترة تلقي العلاجات. نحن هنا لمرافقتكم ولإعطائكم الدعم, العلاج والوسائل التي من خلالها تستطيعون التعامل مع الطريق التي أمامكم. نحن نلائم الدعم العاطفي الخاص والصحيح لكل عائلة وذلك من مجمل طرق الدعم والعلاجات المتوفرة لدينا.

نحن موجودون هنا معكم لكي نكون شركاء لكم في دريكم.

