

# דף מידע והנחיות למטופל/ת

## הנחיות לקראת בדיקת EMG

יש להימנע ממריחת קרמים או משחות טרם הבדיקה ולהגיע בבגדים רחבים שניתן להפשיל מעל המרפק והברך.

מומלץ להפסיק טיפול ב- **Mestinon / Pyridostigmine** 12 שעות לפני בדיקת סיב בודד **SFEMG / גירוי רפטיבי**, אך רק בהנחיית הרופא המטפל.

בדיקות אלה נחשבות בטוחות, אולם עשויות להיות כרוכות באי נעימות ולעיתים אף בכאב, אם כי לרוב קל.

יש להגיע לבדיקה עם מכתב הפנייה ברור, ולמסור את ממצאי הבדיקה לרופא המפנה. מאחר והאבחנה נקבעת תוך שכלול מכלול הנתונים הקליניים ואינה מתבססת על ממצאי בדיקת EMG בלבד, האבחנה תימסר למטופל ע"י הרופא המפנה בלבד.

### לתשומת לב מטופלים הנושאים קוצבי לב:

אין צורך בהכנה מיוחדת לקראת בדיקות NCS ו-EMG. לקראת בדיקות עם גירוי רפטיבי או סיב בודד SFEMG המטופלים נדרשים לעבור את ההליך הבא:

- יש לוודא עם הקרדיולוג המטפל האם קוצב הלב שלך כולל דפיברילטור. במידה והוא איננו כולל דפיברילטור, אין שום צורך בהכנה נוספת.
- רק במידה וקוצב הלב שלך כולל דפיברילטור**, יש לכבות אותו לפני בצוע הבדיקה ולהדליק אותו מחדש בתום הבדיקה. הליך זה מבוצע על ידי קרדיולוג עם הגעתך לבית החולים. לצורך זאת הנך מתבקש להתקשר למכון EMG בטלפון 03 – 6973689 או לשלוח למייל [NE-@TLVMC.GOV.IL](mailto:NE-@TLVMC.GOV.IL) לקביעת תור מתואם. עלייך להביא ביום הבדיקה את כרטיס הקוצב שלך.



# דף מידע והנחיות למטופל/ת

---

## לתשומת לב מטופלים אשר נוטלים תרופות נוגדות קרישה (PRADAXA ,ELIQUIS,

## COUMADIN ,XARELTO

- ניתן לבצע את בדיקת EMG/NCS ללא הכנה קודמת, אך יש ליידע את הרופא הבודק טרם ביצוע הבדיקה.
- בדיקת סיב בודד **SFEMG** לא מבוצעת בנבדקים הנוטלים נוגדי קרישה. לצורך בדיקה זו יש להפסיק את הטיפול למשך 48 שעות לפחות לאחר התייעצות עם הרופא המטפל שיציע טיפול חלופי במידת הצורך. יש לחדש את הטיפול בנוגד הקרישה בהתאם להנחיות הרופא המטפל.

בברכה

צוות מכון EMG